

〔ビタミンB複合剤〕

|   |   |                    |                                 |
|---|---|--------------------|---------------------------------|
| 製品名   | ビタメジン静注用<br>Vitamedin (第一三共)<br>ダイメジン3B-配合cap25<br>Daimedin3B (日医工) |                    | ノイロビタン<br>Neurovitan<br>(アステラス) |
| 成分  | 剤形<br>注：1V中   | 配合cap25:<br>1 Cap中 | 配合錠：1錠中                         |
| V B <sub>1</sub>  | mg  | 100                | 25                              |
| V B <sub>2</sub>  | mg  | —                  | —                               |
| V B <sub>6</sub>  | mg  | 100                | 25                              |
| V B <sub>12</sub>   | mg  | 1                  | 0.25                            |
| 1日投与量   | 1 V   | 3～4 cap            | 1～3錠                            |
| <p>【効】 ①本剤に含まれるビタミン類の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、妊産婦、授乳婦等）<br/>                 ②本剤に含まれるビタミン類の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合（神経痛、筋肉痛・関節痛、末梢神経炎・末梢神経麻痺）</p> |   |                    |                                 |
| <p>【禁】 《ビタメジン注のみ》本剤成分過敏症<br/>                 【重大な副作用】 《ビタメジン注のみ》ショック、アナフィラキシー様症状</p>   |   |                    |                                 |

### Ⅲ. ビタミン

#### 〔総合ビタミン剤〕

| 製品名  | パンビタン<br>Panvitan<br>(武田) | ワッサーV<br>Wasser V<br>(サンド) | ビタジェクト<br>Vitaject<br>(テルモ) | 【禁】 《パンビタンのみ》<br>妊娠3ヵ月以内または妊娠を希望する婦人への<br>ビタミンA5000IU/日以上との投与（ビタミンA欠<br>乏症の婦人は除く）<br>《ビタジェクトのみ》<br>血友病、本剤配合成分過敏症   |
|--|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| 成分   | 末：1g中                     | 配合顆粒<br>：1g中               | 注：A, B液                     | 【効】 《パンビタン》<br>本剤に含まれるビタミン類の需要が増大し、食<br>事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾<br>患、妊産婦、授乳婦等）<br>《ワッサーV》<br>本剤に含まれるビタミン類の欠乏又は代謝性障<br>害が関与すると推定される疾患（湿疹・皮膚炎<br>群、口唇炎、口角炎、口内炎）<br>《ビタジェクト》<br>経口、経腸管栄養補給が不能又は不十分で高カ<br>ロリー静脈栄養に頼らざるを得ない場合のビ<br>タミン補給 |
| V A  | IU                        | 2,500                      | —                           | 3,300  |
| V B <sub>1</sub>   | mg                        | 1                          | 3                           | 3  |
| V B <sub>2</sub>   | mg                        | 1.5                        | 3                           | 4  |
| V B <sub>6</sub>   | mg                        | 1                          | 5                           | 4  |
| V B <sub>12</sub>  | μg                        | 1                          | —                           | 10   |
| Nicotinamide   | mg                        | 10                         | 30                          | 40   |
| Ca Pantothenate  | mg                        | 5                          | 30                          | —  |
| Panthenol  | mg                        | —                          | —                           | 14   |
| Folic Acid   | mg                        | 0.5                        | —                           | 0.4  |
| V C  | mg                        | 37.5                       | 200                         | 100  |
| V D  | IU                        | 200                        | —                           | 10μg   |
| V E  | mg                        | 1                          | —                           | 15   |
| V K  | mg                        | —                          | —                           | 2(K <sub>1</sub> )   |
| Biotin   | mg                        | —                          | —                           | 0.1  |
| 1日投与量  | 1～2g                      | 1g                         | 1日1キット                      | 【重大な副作用】 《ビタジェクトのみ》<br>ショック、アナフィラキシー様症状  |
| 【備】尿を黄変させ臨床検査値に影響を与えることあり(VB <sub>2</sub> )<br>《ワッサーV, ビタジェクトのみ》尿糖の検出を妨害することあり(VC)<br>《ビタジェクトのみ》尿(潜血、ビリルビン、亜硝酸塩)・便潜血反応検査で偽陰性を呈することあり(VC) |                           |                            |                             |  |