



注射処方箋によるゴールデンウィーク(GW)の調剤・搬送について

GWは5連休のため最長7日分の調剤を行うこととなります。これを一度に搬送すると薬剤部のみならず、病棟でも混乱を起しかねません。また、中止による削除や修正で大量の返却も予想されます。

従いまして、業務を円滑に遂行するために注射処方箋によるGWの調剤・搬送は当日および翌日の実施日分のみとさせていただきます。

処方箋及びラベルは当日+翌日のみ送付してください。

例) 5/3は5/3の実施分+5/4の実施分を調剤・搬送、5/5の実施分は5/4に調剤・搬送する。

※詳細を電子カルテトップページの掲示板にも掲載しています。

内服薬・外用薬の搬送時間について

病棟から「●●さんの内服薬を急ぎで送ってください」との電話連絡が多く、対応に苦慮しています。平日業務時間内(8時半~17時)の内服薬・外用薬の薬剤部から病棟への搬送は、平成29年4月から、1日10回に増便となり、スケジュールは以下のように変更となっています。緊急に薬の搬送が必要な場合以外は、病棟到着予定時間までお待ちください。

<内服薬・外用薬のメッセージャー搬送業務スケジュール(平日業務時間内)>

薬剤部からの搬送時間	病棟到着予定時間
①9:00~	→ 9:40頃
②10:00~	→ 10:40頃
③11:00~	→ 11:40頃
④12:00~	→ 12:40頃
⑤13:00~	→ 13:40頃
⑥14:00~	→ 14:40頃
⑦15:00~	→ 15:40頃
⑧16:00~	→ 16:40頃
⑨17:00~	→ 17:40頃
⑩17:30~	→ 18:10頃

新規採用常備医薬品等のお知らせ

平成 29 年 3 月 17 日に開催された薬事委員会において、別紙のとおり、新規常備医薬品、切り替え医薬品、追加医薬品、医療器具、削除医薬品の各品目が承認されました。平成 29 年 4 月 11 日（火）からオーダー開始となっています。

オーダー一時停止のお知らせ

◎サクシゾン注射用 100mg(一般名:ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム)＜副腎皮質ホルモン剤＞

製造元からの供給が一時的に滞り、当該医薬品が入手できなくなる見込みのため 4 月 25 日からオーダーを一時停止しています。

今後の安定した供給再開の見込みについては、わかり次第、随時連絡いたします。代替薬として「ソル・コーテブ注射用 100mg」が、4 月 25 日よりオーダー開始となっています。

◎リピオドール 480 注 10mL(一般名:ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル)＜ヨード造影剤＞

製造元からの供給が一時的に滞り、当該医薬品が入手できなくなる見込みのため 4 月 25 日からオーダーを一時停止しています。

今後の安定した供給再開の見込みは、8 月末の予定です。

製造販売承認承継、販売移管等のお知らせ

◎ガスター注射液20mg(一般名:ファモチジン)＜H2受容体拮抗剤＞

◎スポンゼル(2.5cm×5cm)(一般名:ゼラチン)＜止血用ゼラチンスポンジ＞

◎セファメジン α注射用0.5g(一般名:セファゾリンナトリウム水和物)＜合成セファロsporin 製剤＞

◎セフゾン細粒小児用10%、カプセル100mg(一般名:セフジニル)＜経口用セフェム系製剤＞

◎ソランタール錠100mg(一般名:チアラミド塩酸塩)＜鎮痛・抗炎症剤＞

◎ナゼアOD錠0.1mg(一般名:ラモセトロン塩酸塩)＜5-HT3受容体拮抗型制吐剤＞

◎ニバジール錠4mg(一般名:ニルバジピン)＜高血圧治療剤＞

◎ノイロピタン配合錠＜混合ビタミン剤＞

製造販売業者：アステラス製薬株式会社→LTLファーマ株式会社

◎★ブドウ糖「ヨシダ」※緊急購入薬

製造販売業者：吉田製薬株式会社→小堺製薬株式会社

◎1%、2%カルボカイン注(一般名:メピバカイン塩酸塩)＜局所麻酔剤＞

◎1%ディプリバン注-キット(一般名:プロポフォール)＜全身麻酔・鎮静剤＞

◎キシロカイン液「4%」(一般名:リドカイン塩酸塩)＜表面麻酔剤＞

◎キシロカインゼリー2%(一般名:リドカイン塩酸塩)＜粘滑・表面麻酔剤＞

◎キシロカイン注射液「0.5%」、「1%」エピレナミン(1:100,000)含有(一般名:リドカイン塩酸塩)＜局所麻酔剤＞

◎キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有(一般名:リドカイン塩酸塩)＜局所麻酔剤＞

◎キシロカイン注ポリアンプ0.5%(一般名:リドカイン塩酸塩)＜局所麻酔剤＞

◎キシロカインビスカス2%(一般名:リドカイン塩酸塩)＜経口表面麻酔剤＞

◎キシロカインポンプスプレー8%(一般名:リドカイン)＜定量噴霧式表面麻酔剤＞

◎静注用キシロカイン2%(一般名:リドカイン塩酸塩)＜表面麻酔剤＞

◎マーカイン注脊麻用0.5%等比重、高比重(一般名:ブピバカイン塩酸塩水和物)＜脊椎麻酔剤＞

製造販売業者：アストラゼネカ株式会社→アスペンジャパン株式会社

包装変更等のお知らせ

◎★エネーボ配合経腸用液<タンパクアミノ酸製剤>※緊急購入薬

◎エンシュア・H<タンパクアミノ酸製剤>

バニラ味香料調製

◎エルタシン軟膏 0.1%(一般名:ゲンタマイシン硫酸塩)<アミノグリコシド系抗生物質製剤>

販売名変更: エルタシン軟膏 0.1%→ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「F」

容器ラベルの変更

◎ペピオゲル 2.5%(一般名:過酸化ベンゾイル)<尋常性ざ瘡治療剤>

添加物に「エデト酸ナトリウム水和物」を追加

◎リウマトレックスカプセル 2mg(一般名:メトトレキサート)<抗リウマチ剤>

PTP シートデザイン変更

効能・効果等追加のお知らせ

◎コペガス錠 200mg(一般名:リバビリン)<抗ウイルス剤>

レベトールカプセル 200mg(一般名:リバビリン)<抗ウイルス剤>

【効能・効果】ソホスブビルとの併用による以下のいずれかのC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善
セログループ1(ジェノタイプ1)又はセログループ2(ジェノタイプ2)のいずれにも該当しない患者

◎シンポニー皮下注 50mg シリンジ(一般名:ゴリムマブ(遺伝子組換え))<ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤>

【効能・効果】潰瘍性大腸炎

【用法・用量】成人には初回投与時に200mg、初回投与2週後に100mgを皮下注射。初回投与6週目以降は100mgを4週に1回、皮下注射。

◎ステラーラ皮下注 45mg シリンジ(一般名:ウステキヌマブ(遺伝子組換え))<ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤>

【効能・効果】中等症から重症の活動期クローン病の維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)

【用法・用量】ウステキヌマブ(遺伝子組換え)の点滴静注製剤を投与8週後に、成人には90mgを皮下投与し、以降は12週間隔で90mgを皮下投与する。なお、効果が減弱した場合には、投与間隔を8週間に短縮できる。

◎★ゾレア皮下注用 75mg、150mg(一般名:オマリズマブ(遺伝子組換え))<気管支喘息治療剤>※緊急購入薬

【効能・効果】特発性の慢性蕁麻疹(既存治療で効果不十分な患者に限る)

【用法・用量】成人及び12歳以上の小児には1回300mgを4週間毎に皮下注射。

◎タミフルドライシロップ 3%(一般名:オセルタミビルリン酸塩)<抗インフルエンザウイルス剤>

【用法・用量】新生児、乳児の場合:3mg/kg(ドライシロップ剤として100mg/kg)

◎★ノベルジン錠 50mg(一般名:酢酸亜鉛水和物)<ウィルソン病治療剤(銅吸収阻害剤)>※緊急購入薬

【効能・効果】低亜鉛血症

【用法・用量】成人及び体重30kg以上の小児:1回25~50mgを開始用量とし1日2回経口投与。体重30kg未満の小児:1回25mgを開始用量とし1日1回経口投与。適宜増減、最大投与量は成人及び体重30kg以上の小児:1日150mg(1回50mgを1日3回)、体重30kg未満の小児:75mg(1回25mgを1日3回)。食後投与。

「ヒーロン眼粘弾剤」自主回収のお知らせ

本剤の製造時の不具合により無色ガラス容器（内筒）の開口部を損傷し、製剤中に微細なガラス粒子が混入した可能性が否定できないため、自主回収となりました。

つきましては、院内に在庫されている「ヒーロン V0.6 眼粘弾剤 2.3%」（ロット番号：UB32491）があれば、至急薬剤部まで御返却下さい。

なお、現在まで本件に起因すると考えられる健康被害の報告はありません。

プラルエント皮下注 75mg/150mg の「最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項」の一部改訂について

【プラルエントの投与条件】

- ①心血管イベントの発現リスクが高く、スタチンの最大耐用量を服用しているが、十分な治療効果が得られていない患者に使用すること
- ②患者に対して、あらかじめ高コレステロール血症治療の基本である食事療法を行い、更に運動療法、禁煙、他の虚血性心疾患のリスクファクター（糖尿病、高血圧症等）の軽減等、必要な治療及び指導を行うこと

※最大耐用量のスタチンを一定期間（FH 患者、冠動脈疾患又は非心原性脳梗塞の既往歴がある患者の使用については、担当医師が臨床上十分な観察期間と判断する期間。糖尿病、慢性腎臓病、末梢動脈疾患の患者の使用については、原則として3ヶ月以上）投与しても、脂質管理目標値に到達しないことを確認する。

販売中止のお知らせ

◎セロトーン静注液 10mg（一般名：アザセトロン塩酸塩）＜5-HT3 アンタゴニスト＞

販売中止のため、在庫がなくなり次第、オーダー中止。

オーダー中止のお知らせ

オーダー中止日	薬剤名	理由
2017. 3. 29	アドエア 500 ディスカス 28 吸入用	在庫がなくなり次第削除
	キューバール 100 エアゾール	在庫がなくなり次第削除
	クレスチン細粒	販売中止のため
	ワッサーV 配合顆粒	販売中止のため
2017. 4. 10	アトワゴリバース静注シリンジ 3mL	在庫がなくなり次第削除
	スピオルトレスピマツト 28 吸入	スピオルトレスピマツト 60 吸入採用のため
	バニヘップカプセル 150mg	販売中止のため
	パンスポリン静注用 1g	在庫がなくなり次第削除
	フォスブロック錠 250mg	在庫がなくなり次第削除
	ベネット錠 2.5mg	在庫がなくなり次第削除
	ペンニードル 32G	ペンニードルプラス 32G4mm 採用のため
	ポンタールカプセル 250mg	在庫がなくなり次第削除
2017. 4. 13	デュロテップ MT パッチ 8.4mg	在庫がなくなり次第削除

適正使用のお願い

◎催眠鎮静薬、抗不安薬および抗てんかん薬の適正使用に関するお願い

承認用量の範囲内において、連用により依存性関連の副作用が発現した症例が報告されています。薬物依存等についての以下の注意喚起を行いますので、最新の添付文書等を十分確認の上、患者の適切な服薬管理、服薬指導をお願いします。

- ① 承認用量の範囲内においても、連用により薬物依存が生じることがあるため、用量及び使用期間に注意し、慎重に投与してください。催眠鎮静薬又は抗不安薬として使用する場合には、漫然とした継続投与による長期使用を避けてください。投与を継続する場合には、治療上の必要性を検討してください。
- ② 承認用量の範囲内においても、連用中における投与量の急激な減少又は投与の中止により、原疾患の悪化や離脱症状があらわれることがあるので、投与を中止する場合には、徐々に減量するなど慎重に行ってください。
- ③ 統合失調症患者や高齢者に限らず、刺激興奮、錯乱等があらわれることがあるので、観察を十分に行ってください。

◎イクセロンパッチ4.5mg、9mg、13.5mg、18mg(一般名:リバステグミン)＜アルツハイマー型認知症治療剤＞

本剤のはがし忘れや複数枚同時使用による過量投与、及び本剤をカットして使用する等、投与量に関わる誤使用の事例が報告されています。以下の点について患者様及び介護者の方等に指導してください。

- ① 1日1枚ずつ24時間毎に貼り替え、その際に先に貼付しているパッチを除去したことを十分確認。
- ② 本剤は医療従事者又は介護者等のもとで使用し、患者様が誤って使用する可能性がある場合には介護者の方が薬剤を適切な場所に保管してください。特に湿布等と混同しないように注意。
- ③ 本剤はカットして使用しないでください。

◎ビームゲン注0.25ml、0.5ml(一般名:組換え沈降B型肝炎ワクチン)＜ウイルスワクチン類＞

過量接種に対する注意

10歳未満への摂取量は1回0.25mLです。10歳未満に本剤0.5mLを接種した事例が報告されています。過量接種にご注意ください。

◎モーラスパップXR120mg(一般名:ケトプロフェン)＜経皮鎮痛消炎剤＞

光接触皮膚炎を防ぐため、以下の点について患者様に指導してください。

- ① 他の人に譲り渡さない。
- ② 外での活動はできるだけひかえ、貼ったところを紫外線にあてない。
- ③ はがした後も、少なくとも4週間は紫外線にあてない。

公知申請について

◎リツキサン注 10mg/ml(一般名:リツキシマブ(遺伝子組換え))＜抗 CD20 モノクローナル抗体＞

【効能・効果】慢性特発性血小板減少性紫斑病

【用法・用量】1回量 375mg/m²を1週間間隔で4回点滴静注

緊急購入薬の診療科限定オード開始のお知らせ

オード開始日	緊急購入薬	対象診療科
2017. 3. 28	ハイゼントラ 20%皮下注 4 g/20mL	第3内科
2017. 4. 19	ゾレア皮下注用 150mg	皮膚科
	テレミンソフト坐薬 2 mg	小児科

名称変更のお知らせ

これまで一般名「グリセリン浣腸 60ml」「グリセリン浣腸 120ml」でオーダされていましたが、5月2日より商品名である「ケンエーG 浣腸液 50%60mL」「ケンエーG 浣腸液 50%120mL」にオーダ名称を変更します。なお、薬剤そのものに変更はありません。

- ・「グリセリン浣腸 60ml」→「ケンエーG 浣腸液 50%60mL」
- ・「グリセリン浣腸 120ml」→「ケンエーG 浣腸液 50%120mL」

「警告」改訂のお知らせ

◎シンポニー皮下注 50mg シリンジ(一般名:ゴリムマブ(遺伝子組換え))<ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤>
潰瘍性大腸炎患者では、本剤の治療を行う前に、ステロイド又は免疫調節剤等の使用を十分勘案すること。また、本剤についての十分な知識と潰瘍性大腸炎治療の経験をもつ医師が使用すること。

医薬品・医療機器等安全性情報 No. 342

★催眠鎮静薬、抗不安薬及び抗てんかん薬の依存性に係る注意事項について

催眠鎮静薬、抗不安薬及び抗てんかん薬のうち、依存性関連の副作用が添付文書に記載されている医薬品について、国内副作用報告の集積状況、国内ガイドライン等に基づき、依存性等の安全性を検討し、今般、「使用上の注意」の改訂を行ったので、その内容及びこれらの医薬品を使用する際に注意すべき点等について紹介。

★最適使用推進ガイドラインについて

「経済財政運営と改革の基本方針2016」において、社会保障分野の改革の取組として、革新的医薬品等の使用の最適化推進を図ることが盛り込まれたことを受け、革新的医薬品を真に必要とする患者に提供するために最適使用推進ガイドラインを作成することとしたので、その内容について紹介。

★重要な副作用等に関する情報

以下の医薬品の使用上の注意のうち、重要な副作用等について改訂(追加)したので内容を紹介する。

◎硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸(商品名:ジオン注無痛化剤付、同注生食液付)

【重要な基本的注意】本剤の投与手技上、以下の事象が発生する可能性があるので十分注意。

直腸腔瘻〔女性の前側の痔核に注射する際、直腸壁全層を注射針が穿通し、膣とその近傍に刺入・注射した場合に発生。このような場合、十分観察、適切な処置を行うこと。〕

【重大な副作用】直腸腔瘻：本剤の投与後に直腸腔瘻があらわれることがあるので、本剤投与後は定期的に観察を行い、瘻孔が認められた場合には、手術等の適切な処置を行うこと。

※直腸腔瘻関連症例：1例(うち死亡0例)(平成25年4月～平成28年12月)

医薬品・医療機器等安全性情報は、医薬品医療機器情報提供ホームページ(<http://www.pmda.go.jp/>)又は厚生労働省ホームページ(<http://www.mhlw.go.jp/>)から確認可能。

改訂内容の重要度 ★：最重要 ※：重要

成分名（薬品名）	主な改訂内容
アルブ ラゾラム（アルブ ラゾラム錠「トーワ」） ロフラゼ プ 酸エチル（ジメトックス錠） エソゾ ピ クロン（ルネスタ錠） エスタゾ ラム（エスタゾ ラム錠「アメル」） クアゼ パム（ト ラール錠） クロキサゾ ラム（セパ ソン錠） クロルジ アゼ ホ キシト （コントロール錠） ジアゼ パム（ジアゼ パム錠「サワイ」、ジアゼ パム錠「トーワ」、セルシンシロップ、ホリゾン注射液） ゴビ クロン（ゴビ クロン錠「トーワ」） ゴルビ テム酒石酸塩（ゴルビ テム酒石酸塩錠「明治」、マイスリー錠） トリアゾ ラム（ハルシオン錠） トリクロホスナトリウム（トリクロールシロップ） ニトラゼ パム（ニトラゼ パム錠「トーワ」） クロチアゼ パム（クロチアゼ パム錠「サワイ」） フルニトラゼ パム（フルニトラゼ パム錠「アメル」） ブロマゼ パム（セニラン錠、レキソタン細粒） ブロチゾ ラム（ブロチゾ ラム OD 錠「サワイ」、レントルシン D 錠） メキサゾ ラム（メレックス錠） リルマサ ホン塩酸塩水和物（リスミー錠） ロラゼ パム（ロラゼ パム錠「サワイ」、ワイパ ックス錠） エチゾ ラム（エチゾ ラム錠「EMEC」、テバ ス錠）	※重要な基本的注意： 連用により薬物依存を生じることがあるので、漫然とした継続投与による長期使用を避けること。本剤の投与を継続する場合には、治療上の必要性を十分に検討すること。 ※重大な副作用：依存性 …連用により薬物依存を生じることがあるので、観察を十分に行い、用量及び使用期間に注意し慎重に投与すること。また、連用中における投与量の急激な減少ないし投与の中止により、離脱症状があらわれることがあるので、投与を中止する場合には、徐々に減量するなど慎重に行うこと。
フェノバル ビ タール（フェノバル 注射液） フェノバル ビ タールナトリウム（ノーバルバル 静注用） 抱水クロール（エスクレ坐剤） クロナゼ パム（リボトリール錠・細粒） クロバ サム（マイスタン錠・細粒） ジアゼ パム（タ イアップ 坐剤） プリミドン（プリミドン錠・細粒「日医工」） ミタゾ ラム（ミタ フレッサ静注）	※重大な副作用：依存性 …連用により薬物依存を生じることがあるので、観察を十分に行い、用量及び使用期間に注意し慎重に投与すること。また、連用中における投与量の急激な減少ないし投与の中止により、離脱症状があらわれることがあるので、投与を中止する場合には、徐々に減量するなど慎重に行うこと。
ラモトリギン（ラミクタール錠・錠小児用）	※用法・用量に関連する使用上の注意： 併用する薬剤については以下のとおり分類されるので留意すること。なお、本剤のグルクロン酸抱合に対する影響が明らかでない薬剤による併用療法では、バルプロ酸ナトリウムを併用する場合の用法・用量に従うこと。本剤のグルクロン酸抱合に対し影響を及ぼさない薬剤：アリピプラゾール、オランザピン、ゾニタド、ガバペンチン、シメジソン、トピラマート、プレガバリン、リチウム、レバチレタム、ペランパネル、ラモサド
フェノバル ビ タール（フェノバル 散、ワコビ タール坐剤）	※重要な基本的注意： 連用により薬物依存を生じることがあるので、てんかんの治療に用いる場合以外は、漫然とした継続投与による長期使用を避けること。本剤の投与を継続する場合には、治療上の必要性を十分に検討すること。

ペンタバルビタルカルシウム（ラボナ錠）	<p>※重要な基本的注意： 連用により薬物依存を生じることがあるので、てんかんの治療に用いる場合以外は、漫然とした継続投与による長期使用を避けること。本剤の投与を継続する場合には、治療上の必要性を十分に検討すること。</p> <p>※重大な副作用：依存性 …連用により薬物依存を生じることがあるので、観察を十分に行い、用量及び使用期間に注意し慎重に投与すること。特にアルコール中毒、薬物依存の傾向又は既往歴のある患者、重篤な神経症 患者に対しては、注意すること。</p>
---------------------	---

その他詳細情報については、医薬品・医療機器情報提供ホームページ (<http://www.pmda.go.jp/>)で確認可能

<別紙>

①新規常備依頼医薬品（合計8品目） 2017年4月11日（火）からオーダ開始予定

No.	商品名	剤形	規格	薬価	会社名	成分・薬効
1	エレルサ 625	錠	50mg	26,900.5	MSD	Elbasvir 抗ウイルス剤 ★グラジナとの併用で高い有効性 ★透析を含む重度腎機能障害患者に対しても有効性が得られる 【発売:2016.11.18】
2	オキファスト 811	注	10mg	362.0	塩野義	Oxycodone Hydrochloride Hydrate 癌性疼痛治療剤 ★中等度から高度の疼痛を伴う各種がんにおける鎮痛に使用 ★オキシコドン内服で疼痛管理をしている症例で、内服できなくなった際の切り替えが容易 【発売:2012.5.28】
3	グラジナ 625	錠	50mg	9,607.3	MSD	Grazoprevir Hydrate 抗ウイルス剤 ★エレルサとの併用で高い有効性 ★透析を含む重症腎機能障害患者に対しても有効性が得られる 【発売:2016.11.18】
4	ティレグラ配合 449	錠	—	62.3	サノフィ	Fexofenadine Hydrochloride /Pseudoephedrine Hydrochloride アレルギー性疾患治療剤 ★第2世代抗ヒスタミン薬の経口配合剤 ★1剤でアレルギー性鼻炎の3大症状に優れた改善効果を発揮 【発売:2013.2.28】
5	トルツ 399	皮下注 オートイン ジェクター	80mg	146,244.0	日本イーライ リリー	Ixekizumab(Genetical Recombination) 乾癬治療剤 ★IL-17Aに対し高い親和性で結合 ★乾癬の皮膚症状、関節症状の高い改善効果 ★関節症性乾癬における関節の構造的損傷進展抑制が認められている 【発売:2016.11.21】
6	ピートルチュアブル錠 219	錠	250mg	182.1	キッセイ薬品	Sucroferric oxyhydroxide 高リン血症治療剤 ★生理的な金属である鉄(III)を含有した独自の複合体構造 ★同効薬と比較し、優れた血清リン低下作用 ★同効薬の臨床試験時の1日薬価:ピートル1019.8円、ホスレノール1170.1円、フォスブロック605.9円、リオナ1102.4円 【発売:2015.11.27】
7	ピラノア 449	錠	20mg	79.7	大鵬薬品 工業	Bilastine アレルギー性疾患治療剤 ★眠気の副作用が少なく、添付文書に自動車運転に関する記載がない ★1日1回の服用で即効性、持続性 【発売:2016.11.18】
8	リアルタ 239	錠	1200mg	212.0	持田製薬	Mesalazine 潰瘍性大腸炎治療剤 ★新規溶解機序のコーティングのため大腸全域に持続的に薬剤を放出 ★メサラジンとして最高用量である4800mgの投与が可能 【発売:2016.11.28】

②切り替え医薬品（合計3品目）

No.	商品名	剤形	規格	薬価	会社名	成分・薬効
1	ゴナックス専用 溶解液付 249	皮下注	80mg	24,370.0	アステラス	Degarelix Acetate 前立腺癌治療剤 ★注射用水、シリンジ、注射針が不要 ★溶解時の操作が簡便になった ★溶解液なしの製品と同薬価 【発売：2017.1.11】
2	ゴナックス専用 溶解液付 249	皮下注	120mg	29,958.0	アステラス	Degarelix Acetate 前立腺癌治療剤 ★注射用水、シリンジ、注射針が不要 ★溶解時の操作が簡便になった ★溶解液なしの製品と同薬価 【発売：2017.1.11】
3	スピオルトレスピ マツ 225	吸入	60吸入	8,401.2	ベーリンガー インゲルハイ ム	Olodaterol Hydrochloride/Tiotropium Bromide Hydrate 気管支拡張剤 ★長時間作用型β2刺激剤オロダテロールと長時間作用 型抗コリン剤チオトロピウムの配合剤 ★28吸入用は14日分、60吸入は30日分 ★28吸入用：4176.4円のため60吸入の方が1吸入 当たりの薬価が安い 【発売：2016.12.1】

③追加医薬品（合計3品目）

No.	商品名	剤形	規格	薬価	会社名	成分・薬効
1	オキノム 811	散	5mg	134.1	塩野義	Oxycodone Hydrochloride Hydrate 癌性疼痛治療剤 ★当院採用は2.5mg製剤のみであったが疼痛増悪時の服用 包数が少なくなることにより患者負担が軽減 ★オキノム散2.5mg：67.1円 【発売：2007.2.5】
2	オレンシア皮下 注オートインジェク ター 399	注	125mg 1mL	28,233.0	小野薬品	Abatacept(Genetical Recombination) T細胞選択的共刺激調節剤(関節リウマチ治療薬) ★手指の不自由な患者にもより確実な投与が可能となる ★112,932円/月 ★エンブレル皮下注50mgへん： 125,008円/月 アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター： 78,582円/月 【発売：2016.5.25】
3	フェントス 821	テープ	2mg	1,094.0	久光製薬	Fentanyl Citrate 癌性疼痛治療剤 ★経皮吸収型製剤のため内服困難な患者に対しても使用可 能 ★当院採用は1mg製剤のみであったが貼付枚数を減らすこと により患者負担が軽減 ★フェントテープ1mg：586.9円のため経済的 【発売：2010.6.24】

④新薬申請時に挙げられた削除可能医薬品（合計7品目）

No.	商品名	剤形	規格	削除理由
1	コヘガス	錠	200mg	エレルサ錠50mg採用のため、削除
2	ジルテック	錠	10mg	ディレグラ配合錠採用のため、削除
3	デュロテップ	パッチ	8.4mg	オキファスト注10mg採用のため、削除
4	ハイナス	錠	75mg	トルツ皮下注80mg採用のため、削除
5	フルナーゼ28噴霧用	点鼻液	50μg	エリサス点鼻粉末採用のため、削除
6	ミオカーム内服液	内服液	33.30%	ピラノア錠採用のため、在庫がなくなり次第、削除

7	リサベン	点眼液	0.50%	ピートルチュアブル錠採用のため、在庫がなくなり次第、削除 ※削除可能医薬品は、全診療科に確認を行い、診療、治療上問題のない場合、削除します。あるいは、特定の診療科で問題のある場合、「診療科限定」に登録します。(注:「診療科限定」は原則、在庫しない医薬品です。)		
---	------	-----	-------	---	--	--

⑤削除医薬品（合計19品目）

No.	商品名	剤形	規格	削除理由		
1	アトコリハース静注シリンジ	注	3mL	使用しなくなったため、在庫がなくなり次第、削除		
2	オレンシア皮下注シリンジ	注	125mg	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター採用のため、在庫がなくなり次第、削除		
3	ゴナックス	皮下注用	80mg・120mg	ゴナックス皮下注専用溶解液付80mg・120mg採用のため、在庫がなくなり次第、削除		
4	スピオルトレスピマツ	吸入	28吸入	スピオルトレスピマツ60吸入採用のため、在庫がなくなり次第、削除		
5	バニヘップ	カプセル	150mg	グラジナ錠50mg採用のため、在庫がなくなり次第、削除(販売中止)		
6	パレイシヨテンポン	—	—	販売中止のため、在庫がなくなり次第、削除		
7	パンスホリン静注用	注	1g	リューブリンPRO注射用キット採用のため、在庫がなくなり次第、削除		
8	ピーガード	錠	20mg	フェントステーフ2mg採用のため、削除(販売中止)		
9			30mg	オキノーム散5mg採用のため、削除(販売中止)		
10	フォスブロック	錠	250mg	キックリカプセル採用のため、在庫がなくなり次第、在庫がなくなり次第、削除		
11	ブリース2センサー	センサー	—	メッセーフフィットチップ採用のため、削除(販売中止)		
12	ベネット	錠	2.5mg	リクラスト点滴静注液採用のため、在庫がなくなり次第、削除		
13	ペンニードル	針	32G ^{テーパー}	ペンニードルプラス32G4mm採用のため、削除		
14	ポンタール	cap	250mg	カロナール錠500mg採用のため、在庫がなくなり次第、削除		
15	マイクロレットSランセット	針	—	メッセーフ針採用のため、削除(販売中止)		
16	リン酸一水素Na(12水塩)	—	—	使用しなくなったため、削除		
17	リン酸二水素Na(2水塩)	—	—	使用しなくなったため、削除		
18	ルティナス	腔錠	100mg	ウトゲスタン腔用カプセル200mg採用のため、在庫がなくなり次第、削除		

⑥医療器具(合計3品目)

No.	商品名	剤形	規格	薬価	会社名	成分・薬効
1	ペンニードルプラス	針	32G 4mm	—	ノボルティスクファーマ	ペン型注入器用注射針 ★針の長さが6mmから4mmになることで垂直に穿刺しやすく皮内注射のリスク軽減 ★皮膚と触れ合う部分が点ではなく面のため、圧力が分散され痛みが軽減
2	メッセーフ	針	30個/箱	—	テルモ	自己血糖測定用穿刺針 ★メッセーフファインタッチ用
3	メッセーフフィットチップ	センサー	30枚/箱	—	テルモ	自己血糖測定用センサー ★メッセーフフィットスマイル用 ★立体チップのため扱いやすい

⑦放射性医薬品(合計2品目)

No.	商品名	剤形	規格	薬価	会社名	成分・薬効
1	オクトレオスキャン430	静注用	—	115,464.0	富士フイルムRIファーマ	Indium(111In)chloride/Pentetoreotide ★ソマトスタチン受容体を有する神経内分泌腫瘍の検出に有用
2	ゾーフイゴ429	静注	—	684,930.0	ハイエル薬品	Radium(223Ra)chloride 骨転移のある去勢抵抗性前立腺癌治療剤 ★静脈内投与で全身の骨転移巣を照射可 【発売:2016.6.1】