

## 添付文書改訂のお知らせ

### イムラン錠 (アザチオプリン)

<追加>

【警告】免疫抑制療法及び移植患者の管理に精通している医師又はその指導のもとで行うこと。

【効能・効果】肝・心移植における拒絶反応の抑制

【用法・用量】初期量：2～3mg/kg 相当量 維持量：1～2mg/kg 相当量

【併用禁忌】生ワクチン（乾燥弱毒生麻しんワクチン、ピケンCAM、乾燥弱毒生風しんワクチン、乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン、乾燥弱毒生水痘ワクチン、経口生ポリオワクチン、イムノブラダー膀胱注用、乾燥BCGワクチン経皮用、ニューモバックス注） \_\_\_\_\_ は当院採用医薬品

<訂正>

【禁忌】本剤の成分に対し重篤な過敏症の既往歴のある患者

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

【重大な副作用】血液障害：顆粒球減少、出血、血小板減少、汎血球減少、貧血

血液障害：再生不良性貧血、汎血球減少、貧血、巨赤芽球性貧血、赤血球形成不全、無顆粒球症、血小板減少、出血

### ボトックス注100 (A型ボツリヌス毒素製剤)

<追加>

【効能・効果】痙性斜頸

【用法・用量】初回投与：30～60単位

初回投与後4週間観察し、効果不十分な場合：さらに合計180単位を上限として追加  
症状再発の場合：合計240単位を上限として再投与（2カ月以内の再投与は避ける）

初回及び初回後の追加投与を含む240単位までの投与により全く反応が認められない場合は、より、高頻度、高投与量で投与を行っても効果が認められないことがあるため、本剤の投与を中止すること。

### ネオーラル内用液・Cap、サンディミュン内用液・Cap・注射液 (シクロスポリン)

<追加>

【警告】免疫抑制療法及び移植患者の管理に精通している医師又はその指導のもとで行うこと。

【効能・効果】心移植

【用法・用量】（経口）移植1日前から10～15mg/kg/dayを1日2回 維持量：2～6mg/kg/day

（注射）移植1日前から3～5mg/kg/day（内服可能となれば経口投与に切り換える）

<訂正：サンディミュン注射液は除く>

【重大な副作用】中枢神経系障害：全身痙攣、意識障害、錯乱、運動麻痺、皮質盲、昏睡等の脳症の徴候

中枢神経系障害：全身痙攣、意識障害、失見当識、錯乱、運動麻痺、小脳性運動失調、視覚障害、視神経乳頭浮腫、不眠等の脳症の徴候

平成13年7月25日

## 薬事委員会 委員各位

## 1. 新規常備依頼医薬品 (合計 28 品目)

商品名	剤形	規格	薬価	会社名	成分・薬効	要求科	治験科
アリテックス	錠	1mg	687.6	アストラ ゼネカ	Anastrozole 閉経後乳癌治療剤 アロマターゼ阻害作用 1日1回の投与で有効	1外 2外	-
アレグラ	錠	60mg	117.5	アベンティス	Fexofenadine HCl 抗アレルギー剤 抗ヒスタミン作用 中枢抑制作用は弱い テルフェナジンの活性代謝物 QTc 間隔の延長は認められない	皮膚 耳鼻	-
アレロック	錠	5mg	89.9	協和発酵	Olopatadine HCl 抗アレルギー剤 選択的抗ヒスタミン作用 鼻閉, 慢性蕁麻疹に有効	耳鼻 皮膚	耳鼻
茵 蒿湯	顆粒	2.5g/包	10.8 (1g)	ツムラ	漢方製剤 胆汁酸非依存性の利胆作用	1内	-
オメプラール	錠	10mg	151.9	アストラ ゼネカ	Omeprazole プロトンポンプインヒビター 再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の 維持療法	1内	1内
オメプラール	注	20mg N	720.0	アストラ ゼネカ	Omeprazole プロトンポンプインヒビター 持続性で確実な胃内 pH コントロ - ル が可能	1内 2外	2外
加ナール	坐	100mg 200mg	24.5 40.7	和光堂	Acetaminophen 小児用解熱剤 投与直後の血中濃度の上昇がはやい	小児	-
サージセル・ アブソーバブル・ ヘモスタット (ガーゼ型)	-	5.1cm × 7.6cm	1,292.8 (1枚)	ジョンソン ・エンド ・ジョンソン	Cellulose oxidized 可吸収性止血剤 手術時の止血 綿型より使用しやすい	脳外	-
ジブレキサ	錠	5mg 10mg	293.4 553.0	日本 イライリ	Olanzapine 精神分裂病治療剤 ドパミン D <sub>2</sub> ・セロトニン 5-HT <sub>2</sub> , アドレナリン, ヒスタミン等拮抗作用 1日1回の投与で有効	精神	-
ストックリン	Cap	200mg	742.3	万有	Efavirenz 抗 HIV 剤 非ヌクレオチド系逆転写酵素阻害剤 他の抗 HIV 剤との併用	3内	-
スベニール デイスホ	注	25mg /2.5mL /シリンジ	2,424.0	中外	Hyaluronate Na 関節機能改善剤 ヒアルロン酸製剤で慢性関節リウマチに 関する適応をあわせもつ シリンジデイスホ製剤	整形	-
セフナート クリーム	外	200mg /10g	58.8 (1g)	鳥居	Liranaftate チオカルバミン酸系外用抗真菌剤 1日1回の塗布で有効	皮膚	皮膚

セルセプト	Cap	250mg	377.9	日本ロシ	Mycophenolate mofetil 免疫抑制剤 腎移植後の難治性拒絶反応を抑制	泌尿	-
セロクエル	錠	25mg 100mg	56.3 199.9	藤沢	Quetiapine fumarate 精神分裂病治療剤 ドパミン D <sub>2</sub> ・セロトニン 5-HT <sub>2</sub> 拮抗作用 錐体外路系副作用を軽減	精神	精神
低分子 デキストラン 糖注	注	500mL	1,093.0	大塚	Dextran 血流改善・体外循環灌流液 脳血栓症に対する血流障害の適応を あわせもつ	脳外	-
ハイアスピリン	錠	100mg	6.4	ハイエル	Aspirin 抗血小板剤 腸溶性製剤 消化器症状を軽減	2内	-
ハ-セプチン	注	150mg /V	80,879.0	日本ロシ	Trastuzumab(遺伝子組み換え) 抗悪性腫瘍剤 抗 HER2 ヒトモノクローナル抗体 HER2 過剰発現が確認された 転移性乳癌に使用	2外	-
ファイラスト スプレー	外	500 µg /V	12,338.7	科研	Trafermin(遺伝子組み換え) 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤 ヒト bFGF(塩基性線維芽細胞増殖因子) 製剤 血管新生肉芽形成を促進	皮膚	皮膚
ブロナック	点眼	5mg /5mL	695.0 (5mL)	千寿	Bromfenac Na hydrate 非ステロイド性抗炎症点眼剤 強力なプロスタグランジン生成阻害作用 1日2回の点眼で有効	眼	-
マイスリー-	錠	10mg	93.9	藤沢	Zolpidem tartrate 入眠剤 速効性短時間型 筋弛緩作用軽減	精神	精神
ユービット	散	100mg /2g/包	3,445.0 (1包)	大塚	Urea( <sup>13</sup> C) H.Pylori 感染診断用剤 Hp 菌が尿素をアンモニアと二酸化炭素に 分解することを利用	1内	-
ラジカット	注	30mg /20mL /A	9,931.0	三菱東京	Edaravone 脳保護剤 フリーラジカル消去作用 脂質の過酸化を抑制 脳細胞の酸化的障害から保護	神内 脳外	神内
リレンザ	外	5mg  (1ブリスタ -)	193.4  (1ブリスタ -)	グラクソ ・スミスクライ ン	Zanamivir hydrate 抗インフルエンザウイルス剤 ナミニダゲ-ゼ'阻害作用 A・B 型インフルエンザウイルスの増殖を 阻止 ディスクハラーを用いた吸入	耳鼻	-
ル-ラン	錠	4mg 8mg	27.0 50.8	住友	Perospirone HCl hydrate 精神分裂病治療剤 ドパミン D <sub>2</sub> ・セロトニン 5-HT <sub>2</sub> 拮抗作用 錐体外路系副作用を軽減	精神	-

## 2. 規格追加医薬品 (合計 1 品目)

商品名	剤形	規格	薬価	会社名	成分・薬効	要求科	治験科
セフトアゾロン	注	0.5g/V	600.0	三共	Cefmetazole Na セフトム系抗生物質 小児用量に使用しやすい規格	小児	-

## 3. 切り替え医薬品 (合計 4 品目)

商品名	剤形	規格	薬価	会社名	成分・薬効	要求科	治験科
エポエチン S	注	6,000U /シリンジ	11,922.0	中外	Epoetin ヒトエリスロポエチン製剤(遺伝子組換え) シリンジタイプ製剤 セラチンフリー ハイアル製剤と切り替え	泌尿	-
コウジン末	末	-	44.7 (1g)	ツムラ	漢方製剤 正官庄コウジン末(製造中止)と 切り替え	1内	-
セファメジン キット	注	1g	1,193.0	藤沢	Cefazolin Na セフトム系抗生物質 キット製剤 セファメジン キット 2g 製剤と切り替え	薬剤	-
ハファリン 330	錠	330mg	6.4	ライオン	Aspirin, Aluminum glycinate, Magnesium carbonate 解熱鎮痛消炎剤 ハファリン錠(製造中止)と切り替え	薬剤	-

コウジン末, ハファリン 330 錠については事後報告のため既にオーダ可能

## 4. 削除医薬品 (合計 124 品目 <本表 6 品目> + <別紙 118 品目> )

商品名	剤形	規格	削除理由
アフェマ	錠	1mg	アリミテックス(1mg) 採用時には切り替え削除
アンビハ	坐	100mg	加ナール坐(100mg) 採用時には切り替え削除
アンビハ	坐	200mg	加ナール坐(200mg) 採用時には切り替え削除
ニコラン	点眼	5mg/5mL	プロナック点眼液採用時には切り替え削除
ハトラフェン	液	10mL	セフナートクリーム採用時には切り替え削除
ハファリン 81	錠	81mg	ハイアスピリン(100mg) 採用時には切り替え削除

HF頁	コード	薬品名	剤形	規格	薬効	薬< :同成分薬剤, :投与経路,用量が大きく異なる同成分薬
2	ハラシ01	バラシリン	錠	250mg	ペニシリン系抗生物質	ビクシリンcap (250mg)
2	ビクシ02	ビクシリン	D S	100mg/g	ペニシリン系抗生物質	サワシリン細粒 (100mg/g), ビクシリンc a p (250mg)
6	ケフレ01	ケフレックス	C a p	250mg	セフェム系抗生物質 (第1世代)	ケフラルc a p (250mg)
6	ケフレ02	ケフレックスD S	D S	200mg/g	セフェム系抗生物質 (第1世代)	ケフラル細粒 (100mg/g)
10	ケイ行61	ケイテン	注	0.5g/V	セフェム系抗生物質 (第3世代)	プロアクト注 (1g)
10	セフス01	セフспан	C a p	100mg	セフェム系抗生物質 (第3世代)	セフゾンcap (100mg)
10	セフス02	セフспан	細粒	50mg/g	セフェム系抗生物質 (第3世代)	セフゾン細粒 (100mg/g)
10	トミ02	トミロン	細粒	100mg/g	セフェム系抗生物質 (第3世代)	トミロン錠(100mg), パナン細粒 (100mg/g), セフゾン細粒(100mg)
45	フレ64	油性プレオ	注	30mg/2mL/V	抗悪性腫瘍薬 (抗生物質)	プレオ注 (30mg)
47	スマン61	スマンクス	注	4mg/V	抗悪性腫瘍薬 (抗生物質)	スマンクス注 (6mg)
47	スマン63	スマンクス懸濁用	-	4mL/A	-	-
60	メタホ61	メタボリンG	注	10mg/1mL/A	ビタミンB <sub>1</sub>	アリナミンF注(50mg)
62	ナイク61	ナイクリン	注	20mg/1mL/A	ビタミン (ニコチン酸類)	ニコチン酸アミド散
66	ケワン01	ケワン	錠	5mg	ビタミンK	ケイツーc a p (5mg)
68	ビタノ61	ビタノイリン	注	-	ビタミンB (複合)	ネオラミンスリービー注, ビタメジン注
71	ジエノ66	ジェノトロピンカピクイ	注	1mg/V	下垂体ホルモン	ジェノトロピン注 (5.3mg)
71	ジエノ67	ジェノトロピンカピクイ	注	1.3mg/V	下垂体ホルモン	ジェノトロピン注 (5.3mg)
71	ジエノ91	ジェノトロピンペン	-	-	注射器	-
72	アトニ61	アトニン-O	注	1U/1mL/A	子宮収縮薬	アトニン-O注 (5U)
73	エルシ61	エルシトニン	注	10U/mL/A	骨量低下抑制薬 (カルシトニン類)	サーモトニン注 (10U)
77	サクシ63	サクシゾン	注	1000mg/V	副腎皮質ホルモン	サクシゾン注 (100mg, 500mg)
79	フレト02	プレドニゾロン	錠	5mg	副腎皮質ホルモン	プレドニン錠 (5mg)
80	ハラメ01	パラメゾン	錠	2mg	副腎皮質ホルモン	メドロール錠 (4mg), プレドニン錠 (5mg)
80	リメタ61	リメタゾン	注	4mg/1mL/A	副腎皮質ホルモン	デカドロン注 (8mg)
81	ハイト63	ハイドロコートン	注	500mg/10mL/V	副腎皮質ホルモン	ハイドロコートン注(100mg)
92	エバス02	エバステル	錠	10mg	抗ヒスタミン薬	エバステル錠 (5mg)
93	ヒレチ02	ピレチア	錠	25mg	抗ヒスタミン薬 (フェノチアジン系)	ヒベルナ錠 (25mg)
93	ヒレチ03	ピレチア	細粒	100mg/g	抗ヒスタミン薬 (フェノチアジン系)	ヒベルナ細粒 (100mg/g)
95	プロニ01	プロニカ	錠	80mg	抗アレルギー薬 (抗TXA <sub>2</sub> )	オノンc a p (112.5mg), アイピーディc a p (100mg)
95	ハカ002	ベガ	錠	200mg	抗アレルギー薬 (抗TXA <sub>2</sub> )	オノンc a p (112.5mg), アイピーディc a p (100mg)
96	ハミラ01	ベミラストン	錠	10mg	抗アレルギー薬	リザベンC a p (100mg)
104	アルキ61	アルギメート	注	20g/200mL/袋	高アンモニア血症治療薬	ラクツロースsy (600mg/mL), モニラックsy (650mg/mL), ポルト
104	ケノコ01	ケノコール	C a p	100mg	利胆薬	ウルソ錠(100mg), ウルソサン錠(50mg)
106	タチオ01	タチオン	錠	100mg	中毒治療薬	タチオン注(200mg)
106	タチオ61	タチオン	注	100mg/A	中毒治療薬	タチオン注(200mg), アギフトールS注 (200mg)
110	キモタ01	キモタブ	錠	-	消炎酵素薬	ダーゼン錠 (5mg), エンピナーズP D錠 (18000U)
112	チトレ01	チトレスト	C a p	10mg	酵素製剤	ロイコン錠(10mg), アデホスコール錠(20mg)
113	ダオニ01	ダオニール	錠	1.25mg	経口糖尿病薬	オイグルコン錠(1.25mg)
113	ダオニ02	ダオニール	錠	2.5mg	経口糖尿病薬	オイグルコン錠(2.5mg)
122	オクワ61	オクワラスト	注	10mg/4mL/A	代謝性医薬品	アレディア注 (15mg), ビスフォナル注 (10mg)
123	ヒュー64	ヒューマリンR-100	注	1000U/10mL	インスリン製剤	ヒューマリンR-40注 (400U/10mL), ヒューマカートR注 (300U)
131	マルト61	マルトス10	注	10%/500mL/V	糖液	ブドウ糖注
132	イント65	イントラリポス20%	注	50mL/袋	脂肪酸製剤	イントラリピッド注20% (100mL), イントラリポス注10% (250mL)
133	アミニ61	アミニック	注	200mL/V	総合アミノ酸輸液	アミニック注 (300mL)
136	フルク63	フルクトラクト	注	200mL/V	電解質液	フルクトラクト注 (500mL)

139	トリハ62	トリパレン2号	注	600mL/袋	糖・電解質液(高カロリー輸液)	トリパレン2号注(1200mL), ハイカリック2号注(700mL)
145	レフチ61	レプチラーゼS	注	1mL/A	止血薬	トランサミン注(250mg), トランサミンS注(1g)
152	ウロキ66	ウロキナーゼ	注	12万U/V	血栓溶解薬	グルドパ注(600万U), クリアクター注(40万U)
152	ソリナ61	ソリナーゼ	注	260万U/V	血栓溶解薬	グルトパ注(600万U), クリアクター注(40万U)
154	ノピア61	ノピア	注	200μg/V	血球減少予防・治療薬	アンサー注(10μg)
155	ロイコ63	ロイコプロール	注	800万U/V	血球減少予防・治療薬	グラン注, ノイトロジン注, ノイアップ注
160	カシワ61	カシワドール	注	20mL/A	サリチル酸系鎮痛薬	ノイロトロピン注(3.6U)
168	ナパノール	ナパノール	錠	200mg	フェニル酢酸系消炎鎮痛薬	ボルタレン錠(25mg), ナポールSRcap(37.5mg)
174	ベノプラント	ベノプラント	錠	-	抗炎症薬	ノイチーム錠(30mg), ダーゼン錠(5mg)
178	ソメリン	ソメリン	錠	10mg	催眠鎮静薬(ベンゾジアゼピン系)	ドラール錠(15mg, 20mg), ダルメートcap(15mg)
182	リスト01	リストミンS	Cap	200mg	催眠鎮静薬	アモバン錠(10mg), ハルシオン錠(0.25mg)
190	ヒダント03	ヒダントールF	錠	-	抗てんかん薬	アレピアチン錠(100mg)
200	ヒルナ03	ヒルナミン	細粒	100mg/g	フェノチアジン系抗精神病薬	レボトミン散(100mg/g)
201	トロペロン	トロペロン	錠	3mg	ブチロフェノン系抗精神病薬	インプロメン錠(3mg, 6mg)
201	ノバミン	ノバミン	注	5mg/1mL/A	フェノチアジン系抗精神病薬	コントミン注(10mg, 25mg), ノバミン錠(5mg)
202	プロピタン	プロピタン	散	100mg/g	ブチロフェノン系抗精神病薬	インプロメン細粒(10mg/g), セレネース細粒(10mg/g)
205	エリスパン	エリスパン	錠	0.25mg	ベンゾジアゼピン系精神安定薬	セダプラン錠(5mg), セルシン錠(2mg, 5mg)
205	クレミン	クレミン	顆粒	100mg/g	イミノジベンジル系抗精神病薬	クレミン錠(25mg)
209	セレナル	セレナル	錠	10mg	ベンゾジアゼピン系精神安定薬	セバゾン錠(2mg), メレックス錠(1mg)
215	グリセオール	グリセオール	注	500mL/V	脳機能・代謝調整薬	グリセオール注(200mL)
216	ルシドリール	ルシドリール	注	250mg/V	脳機能・代謝調整薬	ニコリン注(500mg), ニコリンH注(1g), ルシドリール錠(100mg)
217	エコナル	エコナル	注	5mg/2mL/A	脳機能・代謝調整薬	エリルS注(30mg)
217	ニコリン	ニコリン	注	250mg/2mL/A	肝機能・代謝調整薬	ニコリン注(500mg)
222	キシロカイン1%	キシロカイン1%	注	100mL/V	局所麻酔薬	キシロカイン注1%(20mL)
236	アデル	アデル	注	10mg	強心薬	コアテック注(5mg), ミルリーラK注(22.5mg)
238	アカルディ	アカルディ	Cap	2.5mg	心不全治療薬	アカルディcap(1.25mg)
240	フランドル	フランドル	錠	20mg	亜硝酸薬	ニトロールRcap(20mg), アイトロール錠(20mg)
241	ニトロール	ニトロール	スプレー	163.5mg/10g/缶	亜硝酸薬	ミオコールスプレー
242	ニトプロ	ニトプロ	注	6mg/2mL/A	血圧降下薬	ニトプロ注(30mg)
244	ピメノール	ピメノール	Cap	50mg	不整脈治療薬(a群)	ピメノールcap(100mg)
247	プロノン	プロノン	錠	150mg	不整脈治療薬(c群)	サンリズムcap(25, 50mg), タンボコール錠(50mg, 100mg)
257	サンドノーム	サンドノーム	錠	1mg	-遮断薬	ハイパジール錠(6mg)
258	ミケランLA	ミケランLA	Cap	15mg	-遮断薬	インデラル錠(10mg)
259	デタントール	デタントール	錠	0.5mg	-遮断薬	デタントールR錠(3mg)
260	ヒテルギン	ヒテルギン	錠	1mg	-遮断薬	-
263	ルネトロン	ルネトロン	注	0.5mg/1mL/A	降圧利尿薬	ラシックス注(20mg, 100mg), ルネトロン錠(1mg)
269	ナルモナル	ナルモナル	錠	15mg	降圧薬(サイアザイド類似)	ナトリックス錠(1mg)
272	MD S	MD S	錠	150mg	高脂血症治療薬	ベザトールSR錠(200mg), エパデルS cap(600mg/包)
273	ドルナー	ドルナー	錠	20μg	末梢血管拡張・循環改善薬	プロサイリン錠(20μg)
280	テラプチク	テラプチク	注	45mg/3mL/A	呼吸促進薬	ドプラム注(400mg)
283	ブロンコリン	ブロンコリン	錠	50μg	気管支拡張薬(刺激)	メプチン錠(50μg), スピロペント錠(10μg), ベロテック錠
286	塩酸エフェドリン	塩酸エフェドリン	散	100mg/g	鎮咳薬(気管支拡張)	メジコン散(100mg/g), アスベリン散(100mg/g)
286	メチエフ	メチエフ	散	100mg/g	鎮咳薬(気管支拡張)	メジコン散(100mg/g), アスベリン散(100mg/g)
288	プロチン	プロチン	末	66mg/g	鎮咳・去痰薬	プロチン液(33mg/mL)
291	アレハール液	アレハール液	外	100mL/V	吸入用薬	ARB吸入液
311	グルマル	グルマル	顆粒	1g/包	消化性潰瘍治療薬	アラント細粒, アルサルミン細粒

312	イサ01	イサロン	顆粒	500mg/g	消化性潰瘍治療薬	アランタ細粒(アルジオキサ配合剤)
313	ソロ02	ソロン	錠	50mg	消化性潰瘍治療薬	アプ्रेस錠(100mg), ムコスタ錠(100mg)
313	ノイ02	ノイエルS	顆粒	400mg/g	消化性潰瘍治療薬	マーズレンS顆粒, セルベックス細粒(100mg/g)
313	ノイ01	ノイエル	C a p	200mg	消化性潰瘍治療薬	アプ्रेस錠(100mg), ウルグートc a p(100mg)
315	プリ03	プリンペラン	シロップ	1mg/mL	消化管機能亢進薬	プリンペラン錠(5mg), ナウゼリンD S(10mg/g)
329	サン45	4%サンピロ	点眼液	5mL	縮瞳薬	サンピロ点眼液(1%, 2%, 3%)
331	ハク42	バクシダール	点眼液	0.3%/5mL	眼科用抗菌薬(ニューキノロン系)	クラビット点眼液
336	ピバ41	ピバレフリン	点眼液	0.04%/5mL	緑内障治療薬	エピスタ点眼液(1.25%), ピバレフリン点眼液(0.1%)
345	ハラ701	パラプロスト	C a p	-	前立腺疾患治療薬	セルニルトン錠, エビプロスタット錠
353	プデ41	プデソン	クリーム	5g	副腎皮質ホルモン(Very Strong)	マイザー軟膏, メサデルム軟膏
357	ロコ41	ロコルテンローション	液	5mL	副腎皮質ホルモン(Mild)	リドメックスコーワローション
366	テラ42	テラマイシン	軟膏	25g	化膿性疾患治療薬	アクロマイシン軟膏
368	エン42	エンペシド	クリーム	10g	白癬治療薬	マイコスポールクリーム, ニゾラールクリーム, アスタットクリ
369	ハイ41	ハイアラージン	液	30mL	白癬治療薬	マイコスポール液, バトラフェン液
371	オル42	オルセノン	軟膏	100g	褥創・皮膚潰瘍治療薬	オルセノン軟膏(30g)
372	ソル41	ソルコセリル	ゼリー	20g	褥創・皮膚潰瘍治療薬	オルセノン軟膏(30g)
373	リフ41	リフラップ	軟膏	5%/30g	褥創・皮膚潰瘍治療薬	オルセノン軟膏(30g), アクトシン軟膏(30g)
375	アロ41	アロアスクD-S	外	50cm <sup>2</sup>	創傷被覆薬	-
375	アロ43	アロアスクD-D	外	180cm <sup>2</sup>	創傷被覆薬	-
378	カト41	カトレップ	貼付	5枚/袋	消炎鎮痛薬(パップ剤)	ミルタックス, アドフィード
379	ビソ63	乾燥BCGワクチン	注	80mg/V	ワクチン	乾燥BCGワクチン(12mg)
385	ヘブ63	ヘブスプリン	注	1000U/5mL/V	血液製剤(グロブリン製剤)	HBグロブリン注(200U)
386	コン62	コンファクトF	注	500U/V	血液製剤(第因子製剤)	クロスエイトM注(1000U)
418	オム72	オムニスキャンシリンジ	注	20mL/V	MR I用造影剤	オムニスキャンシリンジ(10mL, 15mL)
419	プロ61	プロハンス	注	5mL/V	MR I用造影剤	オムニスキャンシリンジ注(10mL)
419	プロ64	プロハンス	注	10mL/V	MR I用造影剤	オムニスキャンシリンジ注(10mL)
434	ヘモ701	ヘモクロン	C a p	200mg	痔疾患治療薬	サーカネッテン錠

血小板凝集抑制剤

P150

アスピリン aspirin バイアスピリン Bayaspirin (バイエル) 錠：100mg 薬価 6.4	【効】狭心症（慢性安定狭心症、不安定狭心症） 心筋梗塞、虚血性脳血管障害（一過性脳虚血発作、脳梗塞）における血栓・閉塞形成の抑制 冠動脈バイパス術あるいは経皮経管冠動脈形成術施行後における血栓・閉塞形成の抑制 【用】1日1回100mg 1回300mgまで増量可
【禁】本剤成分又はサリチル酸系製剤過敏症 消化性潰瘍 出血傾向 重篤な血液異常 アスピリン喘息 出産予定日12週以内の妊婦【重大な副作用】ショック アナフィラキシー様症状 出血 中毒性表皮壊死症（Lyell 症候群） 皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群） 剥脱性皮膚炎 再生不良性貧血 喘息発作【備考】腸溶性製剤	

その他の解熱鎮痛剤

P186

アセトアミノフェン Acetaminophen カロナール Calonal (和光堂) 坐剤：100mg 薬価 24.5 坐剤：200mg 40.7	【効】小児科領域の解熱 【用】1日1回次の用法・用量に従って直腸内挿入（1歳未満：50mg、1～3歳未満：50～100mg、3～6歳未満：100mg、6～12歳：100～200mg）
【重大な副作用】ショック アナフィラキシー様症状 中毒性表皮壊死症（Lyell 症候群） 皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群） 喘息発作の誘発 肝機能障害 黄疸	

ホルモン剤

P50

アナストロゾール anastrozole アリミデックス Arimidex (アストラゼネカ) 錠[劇]:1mg 薬価 687.6	【効】閉経後乳癌 【用】1日1回1mg
【禁】妊娠又はその可能性のある婦人 授乳婦 本剤成分過敏症 【重大な副作用】皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson 症候群)【備考】アロマトラーゼ阻害作用	



脳保護剤

P218

エダラボン edaravone ラジカット Radicut (三菱東京) 注：30mg/20mL/A 薬価 9931	【効】脳梗塞急性期に伴う神経症候、日常生活動作障害、機能障害の改善 【用】1回 30mg を適当量の生食で用時希釈し、30 分以上かけて1日朝夕2回点滴静注 発症後 24 時間以内に投与開始し、投与期間は 14 日以内
【禁】本剤成分過敏症【備考】リ-ジ <sup>®</sup> 加消去作用	

抗 HIV 剤

P29

エファビレンツ Efavirenz ストックリン Stocrin (万有) Cap [劇]: 200mg 薬価 742.3	【効】HIV - 1 感染症 【用】1日1回 600mg (他の抗 HIV 薬と併用すること)
【禁】本剤成分過敏症 テルフェナジン アステミゾール シサプリド トリアゾラム ミダゾラム エルゴタミン製剤【重大な副作用】皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson 症候群) 多形紅斑【備考】非ヌルボト <sup>®</sup> 系逆転写酵素阻害剤	

プロトンポンプ阻害剤

P309

オメプラゾール Na omeprazole sodium オメプラール Omepral (アストラゼネカ) 注：20mg/V 薬価 720.0	【効】経口投与不可能な下記の疾患：出血を伴う胃潰瘍、十二指腸潰瘍、急性ストレス潰瘍及び急性胃粘膜病変、Zollinger-Ellison 症候群 【用】1回 20mg を1日2回点滴静注あるいは緩徐に静注
【禁】本剤成分過敏症【重大な副作用】ショック アナフィラキシー様症状 血管浮腫 気管支けいれん 無顆粒球症 汎血球減少症 溶血性貧血 急性肝不全 黄疸 中毒性表皮壊死症 (Lyell 症候群) 皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson 症候群) 視力障害 間質性腎炎 低 Na 血症 間質性肺炎 横紋筋融解症【備考】プロトンポンプインヒビター 溶解液は生食又は5%ブドウ糖を使用 他の溶解液、輸液、補液及び他剤との混注を避けること	

その他の抗精神病薬

P203

オランザピン olanzapine ジプレキサ Zyprexa (日本イライリ-) 錠 [劇]: 5mg 薬価 293.4 錠 [劇]: 10mg 553.0	【効】精神分裂病 【用】1日1回5~10mg 維持量: 1日1回10mg 1日量は20mgを超えないこと
【禁】昏睡状態 バルビツール酸誘導体等の中枢神経抑制剤の強い影響下 本剤成分過敏症 エピネフリン 【重大な副作用】悪性症候群 (Syndrome malin) 遅発性ジスキネジア 高血糖【備考】ドパミン D <sub>2</sub> ・セロトニン 5-HT <sub>2</sub> 、アドレナリン、ヒスタミン等拮抗作用 MARTA (多元受容体標的化抗精神病薬)	

抗アレルギー剤

P93

塩酸オロパタジン Olopatadine HCl アレロック Allelock (協和発酵) 錠: 5mg 薬価 89.9	【効】アレルギー性鼻炎 蕁麻疹 皮膚疾患に伴うそう痒(湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚そう痒症、尋常性乾癬、多形滲出性紅斑) 【用】1回5mgを1日2回朝、就寝前
【禁】本剤成分過敏症【備考】選択的抗ヒスタミン作用	

その他の抗精神病薬

P203

フマル酸クエチアピン quetiapine fumarate セロクエル Seroquel (藤沢) 錠 [劇]: 25mg 薬価 56.3 錠 [劇]: 100mg 199.9	【効】精神分裂病 【用】1回25mgを1日2又は3回より開始 通常1日量は150~600mgを2又は3回に分服 1日量として750mgを超えないこと
【禁】昏睡状態の患者 バルビツール酸誘導体等の中枢神経抑制剤の強い影響下 エピネフリン 本剤成分過敏症【重大な副作用】悪性症候群 (Syndrome malin) 遅発性ジスキネジア【備考】ドパミン D <sub>2</sub> ・セロトニン 5-HT <sub>2</sub> 拮抗作用	

診断用薬

P404

尿素 ( <sup>13</sup> C) urea ( <sup>13</sup> C) ユービット Ubit (大塚) 散: 100mg/2g/包 薬価 3445/包	【効】ヘリコバクター・ピロリの感染診断 【用】100mg (1包) を 100mL の水に溶かし経口投与
【備考】H.pylori 菌が尿素をアンモニアと二酸化炭素に分解することを利用	

抗ウイルス剤

P28

ザナミビル水和物 zanamivir hydrate リレンザ Relenza (グラク・スミクライン) 外: 5mg (1ブリスター) 薬価 193.4/ブリスター	【効】A型またはB型インフルエンザウイルス感染症 【用】1回 10mg (5mgブリスターを2ブリスター) を1日2回、5日間
【警】必要性を慎重に検討すること 予防投与における有効性及び安全性は確立していない【禁】本剤成分過敏症 【重大な副作用】アナフィラキシー様症状 気管支攣縮 呼吸困難【備考】ノイミダゼム阻害作用	

ベンゾジアゼピン系催眠鎮静剤 (類縁化合物を含む)

P177

酒石酸ゾルピデム zolpidem tartrate マイスリー Myslee (藤沢) 錠 [向]: 10mg 薬価 93.9	【効】不眠症 (精神分裂病及び躁うつ病に伴う不眠症は除く) 【用】1回 5~10mg を就寝直前投与 高齢者は1回 5mg から開始 1日 10mg を超えないこと
【禁】本剤成分過敏症 重篤な肝障害 重症筋無力症 急性狭隅角緑内障【原禁】肺性心、肺気腫、気管支喘息及び脳血管障害の急性期などで呼吸機能が高度に低下している場合【重大な副作用】依存性 離脱症状 精神症状 (幻覚、興奮、脱抑制等) 一過性前向性健忘 呼吸抑制【備考】速効性短時間型 筋弛緩作用軽減	

皮膚欠損治療剤

P371

トラフェルミン trafermin フィブラスト Fiblast (科研) 外：500 µg/V (スプレー) 薬価 12338.7	【効】褥瘡 皮膚潰瘍（熱傷潰瘍、下腿潰瘍） 【用】1日1回 潰瘍の最大径が6 cm 以内の場合：潰瘍面から約5 cm 離して5噴霧 潰瘍の最大径が6 cm を超える場合：薬剤が同一潰瘍面に5噴霧されるよう、潰瘍面から約5 cm離して同様の操作を繰り返す
【禁】投与部位に悪性腫瘍のある患者又はその既往歴 本剤成分過敏症 【備考】ヒトbFGF（塩基性線維芽細胞増殖因子）製剤	

その他の抗腫瘍剤

P52

トラスツズマブ trastuzumab ハーセプチン Herceptin (日本ロシュ) 注：150mg/V 薬価 80879	【効】HER2 過剰発現が確認された転移性乳癌 【用】初回投与時には4mg/kg、2回目以降は2mg/kgを1日1回90分以上かけて1週間間隔で点滴静注
【警】心不全等の重篤な心障害で死亡に至った報告あり 投与開始前は心機能を確認すること 投与中は適宜心機能検査（心エコー等）を行い患者の状態を十分観察すること 特にアントラサイクリン系薬剤投与中又はその前治療歴、胸部へ放射線照射中、心不全症状、冠動脈疾患（心筋梗塞、狭心症等）又はその既往歴、高血圧症又はその既往歴のある患者については心機能検査（心エコー等）を頻回に行うこと アナフィラキシー様症状、重度の肺障害等の副作用が発現し死亡に至った報告あり（特に安静時呼吸困難のある患者又はその既往歴のある患者は重症化しやすい）緊急時に十分な対応が可能な施設及び癌化学療法に十分な経験を持つ医師のもとで、使用上の注意等を遵守の上、投与すること 【禁】本剤成分過敏症【原禁】重篤な心障害【重大な副作用】心障害 アナフィラキシー様症状 呼吸不全 呼吸困難 低血圧 喘息 喘鳴 気管支痙攣 血管浮腫 肺炎 非心原性肺浮腫 胸水 頻脈 低酸素症 成人呼吸窮迫症候群 白血球減少 好中球減少 血小板減少 貧血 肝不全 黄疸 肝炎 肝障害 腎糸球体症 昏睡 脳血管障害 脳浮腫 敗血症【備考】抗HER2ヒト化モノクローナル抗体	

その他の抗精神病薬

P203

<p>塩酸ペロスピロン水和物 perospirone HCl hydrate ルーラン Lullan (住友) 錠 [劇]: 4mg 薬価 27 錠 [劇]: 8mg 50.8</p>	<p>【効】精神分裂病 【用】1回 4mg 1日 3回 維持量: 1日 12~48mg を3回に分服 1日量は 48mg を超えないこと</p>
<p>【禁】昏睡状態 バルビツール酸誘導体等の中枢神経抑制剤の強い影響下 本剤成分過敏症 エピネフリン 【重大な副作用】悪性症候群 (Syndrome malin) 遅発性ジスキネジア 麻痺性イレウス 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群 (SIADH) 【備考】ドパミン D<sub>2</sub>・セロトニン 5-HT<sub>2</sub> 拮抗作用</p>	

その他のリウマチ・関節症治療剤

P172

<p>ヒアルロン酸 Na Sodium hyaluronate スベニール Suvenyl (中外) 注: 25mg/2.5mL/シリンジ 薬価 2424</p>	<p>【効】(1) 1回 2.5mL を1週間毎に連続5回膝関節腔内投与 症状維持: 2~4週間隔で投与 (2) 1回 2.5mL を1週間毎に連続5回肩関節 (肩関節腔、肩峰下滑液包又は上腕二頭筋長頭腱腱鞘) 内投与 (3) 1回 2.5mL を1週間毎に連続5回膝関節腔内投与 【用】(1) 変形性膝関節症 (2) 肩関節周囲炎 (3) 慢性関節リウマチにおける膝関節痛 (下記 (a) ~ (d) の基準を全て満たす場合に限る) (a) 抗リウマチ薬等による治療で全身の病勢がコントロールできていても膝関節痛のある場合 (b) 全身の炎症症状が CRP 値として 10mg/dL 以下の場合 (c) 膝関節の症状が軽症から中等症の場合 (d) 膝関節の LarsenX 線分類が Grade から Grade の場合</p>
<p>【禁】本剤成分過敏症</p>	

抗アレルギー剤

P93

塩酸フェキソフェナジン アレグラ (アベンティス ファーマ) 錠：60mg 薬価 117.5	【効】アレルギー性鼻炎 蕁麻疹 【用】1回 60mg を1日2回
【禁】本剤成分過敏症【重大な副作用】ショック 【備考】抗ヒスタミン作用(中枢抑制作用は弱い) テルフェナジンの活性代謝物(QTc 間隔の延長は認められない)	

その他の点眼剤

P337

ブロムフェナク Na bromfenac sodium hydrate プロナック Bronuck (千寿) 点眼：5mg/mL 薬価 695	【効】外眼部及び前眼部の炎症性疾患の対症療法 [眼瞼炎、結膜炎、強膜炎(上強膜炎を含む) 術後炎症] 【用】1回 1～2滴 1日2回点眼
【禁】本剤成分過敏症	

免疫抑制剤

P116

ミコフェノール酸モフェチル Mycophenolate mofetil セルセプト Cellcept (日本ロシュ) Cap [劇]: 250mg 薬価 377.9	【効】腎移植後の難治性拒絶反応の治療(既存の治療薬が無効又は副作用等のため投与できず、難治性拒絶反応と診断された場合) 【用】1回 1500mg を1日2回 12時間毎に食後経口投与
【禁】本剤成分過敏症 妊娠又はその可能性のある患者【原禁】妊娠する可能性のある患者 【重大な副作用】感染症 汎血球減少 好中球減少 リンパ腫 リンパ増殖性疾患 悪性腫瘍(特に皮膚) 消化管出血 アレルギー反応 イレウス 敗血症 消化管潰瘍 アシドーシス 脱水症 肺水腫	

白癬治療剤

P367

リラナフトート liranaftate ゼフナート Zefnart (鳥居) クリーム：10g 薬価 588	【効】白癬：足白癬、体部白癬、股部白癬 【用】1日1回患部に塗布
【禁】本剤成分過敏症 他の外用抗真菌剤過敏症 臨床所見上皮層カンジダ症あるいは汗疱、掌蹠膿疱症、膿皮症、他の皮膚炎等との鑑別が困難な患者【備考】チオカルバミン酸系	

漢方製剤

P420

茵ちん蒿湯 インチンコウトウ ツムラ茵ちん蒿湯 135 (ツムラ) 顆粒：2.5g/包 薬価 10.8/g	【効】尿量減少、やや便秘がちで比較的体力のあるものの次の諸症：黄疸、肝硬変症、ネフローゼ、じんましん、口内炎 【用】1日7.5gを2～3回食前又は食間に分服
【備考】顆粒7.5g中に茵ちん蒿湯乾燥エキス1.5gを含有 サンシシ：3g インチンコウ：4g ダイオウ：1g	

止血剤

P144

酸化セルロース Oxidized Cellulose サージセル Surgicel (ジョンソン) 外：2.5×5.1(綿型) 薬価 1884.4 外：5.1×7.6(ガーゼ型) 1292.8	【効】各種手術時の止血及び創腔充填 【用】出血創面に直接適用するか、創腔に充填
【禁】骨折面又は椎弓切除術創 大動脈の出血部 非出血性の多量漿液浸出部位 【重大な副作用】骨再生抑制 神経障害 視力障害 異物反応(鼻粘膜壊死、鼻中隔穿孔、腸閉塞、尿管閉塞等)	

プロトンポンプ阻害剤

P309

<p>オメプラゾール omeprazole                  オメプラール Omepral (アストラゼネカ)                  錠：10mg 薬価 151.9                  錠：20mg 264.8</p>	<p>【効】胃潰瘍 十二指腸潰瘍 吻合部潰瘍 逆流性食道炎                  Zollinger-Ellison 症候群                  【用】1日1回 20mg (胃潰瘍,吻合部潰瘍,逆流性食道炎：8週間                  十二指腸潰瘍：6週間) 再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の                  維持療法：1日1回 10~20mg</p>
<p>【禁】本剤成分過敏症【重大な副作用】ショック アナフィラキシー様症状 血管浮腫 気管支けいれん 無顆粒球症                  汎血球減少症 溶血性貧血 急性肝不全 黄疸 中毒性表皮壊死症 (Lyell 症候群) 皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-                  Johnson 症候群) 視力障害 間質性腎炎 低 Na 血症 間質性肺炎                  【備考】プロトンポンプインヒビター 腸溶性フィルムコート錠</p>	

第二世代セフェム系

P7

<p>セフメタゾールナトリウム cefmetazole sodium                  セフメタゾン Cefmetazon (三共)                  注：0.5g/V 薬価 600                  注：1g/V 793                  注：2g/V 1286</p>	<p>【用】1日1~2gを2回に分け静注又は点滴静注 最高1日4gを                  2~4回に分け静注又は点滴静注 小児には1日25~100mg/kgを                  2~4回に分け静注又は点滴静注、最高1日150mg/kg</p>
<p>【禁】本剤成分ショック【原禁】本剤成分又はセフェム系抗生物質過敏症【重大な副作用】ショック 急性腎不全 無                  顆粒球症 溶血性貧血 偽膜性大腸炎 間質性肺炎 PIE 症候群</p>	



サリチル酸系抗炎症剤

P161

アスピリン、アルミニウムグリシネート、炭酸マグネシウム aspirin, aluminum glycinate, magnesium carbonate バファリン 330 Bufferin330 (ライオン) 錠：330mg 薬価 6.4	【効】(1)頭痛、歯痛、月経痛、感冒の解熱 (2)慢性関節リウマチ、リウマチ熱、症候性神経痛 【用】(1)1回2錠、1日2回 (2)1回2~4回、1日2~3回
【禁】本剤成分又はサリチル酸系製剤過敏症 消化性潰瘍 重篤な血液異常 重篤な肝障害 重篤な腎障害 重篤な心機能不全 アスピリン喘息 スルフィンピラゾン【重大な副作用】ショック アナフィラキシー様症状 喘息発作の誘発 中毒性表皮壊死症(Lyell症候群) 皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群) 剥脱性皮膚炎 再生不良性貧血	

第一世代セフェム系

P5

セファゾリンナトリウム cefazolin sodium セファメジン Cefamezin (藤沢) 注：0.5g/V 薬価 320 注：1g/V 612 注：2g/V 1123 注：1gキット(生理食塩水100mL) 1193	【用】1日1gを2回に分けて緩徐に静注、筋注、点滴静注 効果不十分：1日1.5~3gを3回に分割投与 1日最高5g [小児] 20~40mg/kgを2回に分けて緩徐に静注、筋注、点滴静注 効果不十分：1日50mg/kgを3回に分割投与 最高1日100mg/kg
【禁】本剤成分ショック【原禁】本剤成分又はセフェム系抗生物質過敏症【重大な副作用】ショック アナフィラキシー様症状 汎血球減少 無顆粒球症 溶血性貧血 血小板減少 肝障害 腎障害 大腸炎 皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群) 中毒性表皮壊死症(Lyell症候群) 間質性肺炎 PIE症候群 けいれん	

<p>エポエチン (遺伝子組換え)                  epoetin beta(genetical recombination)                  エポジン Epogin (中外)                  注〔劇〕: 1500 単位/V 薬価 3292                  注〔劇〕: 3000 単位/V 6037                  S注〔劇〕: 6000 単位/シリンジ 11922</p>	<p>【効】(1)(1500・3000 I.U.のみ)透析施行中の腎性貧血 (2)連続携                  行式腹膜灌流(CAPD)施行中の腎性貧血 (3)透析導入前の腎性貧                  血 (4)貯血量が 800 mL 以上で 1 週間以上の貯血期間を予定する                  手術施行患者の自己血貯血                  【用】〔静注〕(1)1 回 3000 I.U.週 3 回緩徐に投与 維持量 1 回                  1500 I.U.週 2～3 回又は 1 回 3000 I.U.週 2 回投与 最高 1 回 3000                  I.U.週 3 回まで (3)1 回 6000 I.U.週 1 回緩徐に投与 維持量 1 週                  当たり 6000 I.U.以下で適宜調整 (4)手術前の自己血貯血時期に                  1 回 6000 I.U.隔日週 3 回緩徐に投与 投与期間は予定貯血量が                  800 mL の場合は術前 2 週間 1,200 mL の場合は術前 3 週間 〔皮                  下注〕(2)(3)1 回 6000 I.U.週 1 回投与 維持量 1 回 6000～                  12000 I.U. 2 週に 1 回投与 小児には 1 回 50～100 I.U./kg を週 1                  回投与 維持量 1 回 100～200 I.U./kg 2 週に 1 回投与</p>
<p>【禁】本剤又は他のエリスロポエチン製剤過敏症 【重大な副作用】ショック 高血圧性脳症 脳梗塞</p>	

<p>コウジン red ginseng                  ツムラの生薬コウジン末 (ツムラ)                  末: 薬価 44.7/g</p>	<p>【効】漢方処方調剤に用いる</p>
--	----------------------

## 〔 血漿代用液 〕

P143

	医薬品名	容量 (mL)	陽イオン mEq/L			陰イオン mEq/L		Glucose	その他/袋
			Na <sup>+</sup>	K <sup>+</sup>	Ca <sup>+</sup>	Cl <sup>-</sup>	Lactate <sup>-</sup>		
デキストラン製剤	低分子デキストランL Low Molecular Dextran L (大塚) 薬価 1112	500mL/袋	130	4	3	109	28		デキストラン40 50g
	低分子デキストラン糖注 Low Molecular Dextran D (大塚) 薬価 1093	500mL/袋						25g	デキストラン40 50g
<p>【効】(L) 代用血漿として急性出血の治療 特に急性大量出血の際の初期治療 外傷・熱傷・出血などに基づく外科的ショックの予防及び治療 手術時における輸血量の節減 体外循環灌流液</p> <p>(D) 出血及びこれにより生じるショックの治療 手術時における輸血の節減 血栓症の予防及び治療 外傷・熱傷・骨折等及び重症ショック時の末梢血行改善 体外循環灌流液</p> <p>【用】(L) 1回500mLを緩徐に静注 体外循環灌流液として：20～30mL/kg</p> <p>(D) 1回500mLを静注 最初の24時間：20mL/kg</p> <p>血栓症の予防及び治療：1日10mL/kg以下、5日以内 体外循環灌流液：10～20mL/kg</p> <p>【禁】(L・D共通)うっ血性心不全 (L) 高乳酸血症 (D) 低張性脱水症</p> <p>【重大な副作用】(L・D共通)ショック 急性腎不全 (D) 過敏症</p> <p>〔備〕(L・D共通)血液型判定又は交叉判定を妨害することがある</p>									