

2002.7.1. 山口大学病院 DIセンター
(22-2668)

『効能・効果』追加のお知らせ

アクトス錠 15・30

【効能・効果】2型糖尿病

ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られずインスリン抵抗性が推定される場合に限る。

食事療法、運動療法のみ

食事療法、運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用

食事療法、運動療法に加えて - グルコシダーゼ阻害剤を使用

「インスリン製剤と本剤の併用」並びに「 - グルコシダーゼ阻害剤、スルホニルウレア剤及び本剤の3剤併用」は承認されていない。

【用法・用量】通常、成人にはピオグリタゾンとして15～30mgを1日1回朝食前又は朝食後に経口投与する。なお、性別、年齢、症状により適宜増減するが、45mgを上限とする。

医薬品適正使用情報

K.C.L. 注射液(1号)(40mEq/20mL/A)

原液のまま直接投与したことによる死亡事故が報告されている。

必ずカリウムとして40mEq/L以下の濃度に薄めて使用すること。

- 注意事項 -

必ずアンプル1本(20mL)を1000mL以上の適当な希釈剤で希釈して使用すること。

本剤1アンプル(20mL)を1000mLの希釈剤で希釈した場合、およそ0.3W/V%の塩化カリウム溶液(カリウムとして40mEq/L)となる。

希釈液として1分間に8mLを超えない速度で点滴静脈内注射すること。

点滴静脈内投与にのみ使用し、投与速度に注意。

定められた1日量〔成人では本剤1日50mL(アンプル2.5本)以内〕を守ること。

塩化カリウムとして7.5g、カリウムとして100mEqを超えないこと。

承認された「効能・効果」及び「用法・用量」、「使用上の注意」等に留意すること。

長期投与(30日分)についてのお知らせ

フィブラストスプレー500

【効能・効果】褥瘡、皮膚潰瘍(熱傷潰瘍、下腿潰瘍)

新医薬品の期間(薬価収載から1年)が終了し、7月1日から30日分の投与可能。

臨床検査結果に及ぼす影響

ビタミンB₂：尿を黄変させ、臨床検査値に影響を与えることがある。

ビタミンC：尿糖の検出を妨害することがある。

各種の尿検査（潜血、ビリルビン、亜硝酸塩）・便潜血反応検査で、偽陰性を呈することがある。

< 当院採用のビタミン B₂、ビタミン C 含有製剤 >

	内用薬	注射薬
ビタミン B ₂ 含有製剤	フラビタン錠 5mg ハイボン錠 20mg ノイロピタン錠 ノイロピタン細粒 ビタノイリン Cap パンピタン末 ワッサー-V 顆粒	フラビタン 10mg/1mL フラビタン 20mg/2mL MVI 5mL オーツカ MV (1,2 号セット) ソービタ (1,2,3 号セット) ネオラミンマルチ V マルタミン ビタミロ 12 ビタジェクト (A,B 液セット)
ビタミン C 含有製剤	ハイシー顆粒 250mg/g シナール顆粒 200mg/g パンピタン末 ワッサー-V 顆粒	ビタシミン 100mg/1mL ビタシミン 500mg/2mL MVI 5mL オーツカ MV (1,2 号セット) ソービタ (1,2,3 号セット) ネオラミンマルチ V マルタミン ビタミロ 12 ビタジェクト (A,B 液セット)

_____ はビタミン B₂、ビタミン C とともに含有している薬剤。

販売中止のお知らせ

動物由来原料を用いたアレルギーエキス

厚生労働省 医薬局審査管理課長通知 医薬審発第 1552 号を受け、当該製品のアレルギーエキス 28 種 55 品目について、ウイルス不活化 / 除去処理の方法を検討したが、現時点では成分であるアレルギー（抗原タンパク）の性質上、ウイルス不活化 / 除去処理を行うことが困難であるため、9 月末をもって販売中止。

< 医薬審発第 1552 号該当製品（28 種 55 品目） >

	製品	スクラッチエキス	皮内エキス	治療エキス		製品	スクラッチエキス	皮内エキス	治療エキス
表皮類	犬毛				食品類	バター			
	兔毛					マヨネーズ			
	牛毛					卵黄			
	牛皮					卵白			
	羽毛					兔肉			
	猫毛					牛肉			
	猫毛皮膚					鯨肉			
	豚毛					ソーセージ			
	羊毛					トリ肉			
	ウズラ全卵					ハム			
食品類	牛乳				羊肉				
	全卵				豚肉				
	脱脂粉乳				ベーコン				
	チーズ				合計	20 種 20 品目	27 種 27 品目	2 種 8 品目	
	調製粉乳								

治療エキス：1:10、1:100、1:1,000、1:10,000 の 4 濃度がある。