



「効能・効果」、「用法・用量」追加及び変更のお知らせ

アンカロン錠 100(一般名:アミオダロン塩酸塩) <不整脈治療剤>

【効能・効果】心不全(低心機能)又は肥大型心筋症に伴う心房細動

ブレセデックス静注液 200 µg「マルイシ」(一般名:デクスメドミジン塩酸塩) < 2 作動性鎮静剤 >

【効能・効果】集中治療における人工呼吸中及び離脱後の鎮静

【用法・用量】6 µg/kg/時で10分間静注(初期負荷投与)、0.2~0.7 µg/kg/時で持続注入(維持投与)
維持投与から開始することもできる(適宜減速)

24時間を超える長期投与及び挿管を伴わない人工呼吸離脱後の鎮静への使用が可能となった

「禁忌」追加のお知らせ

エフピーOD錠 2.5(一般名:セレギリン塩酸塩) <パーキンソン病治療剤>

【併用禁忌】デュロキセチン塩酸塩(サインバルタ)、アトモキセチン塩酸塩(ストラテラ)、ミルタザピン(レメロン)
[両薬剤の作用が増強される可能性あり]

ジフルカン cap 100mg(一般名:フルコナゾール) <深在性真菌症治療剤>

プロジフ静注液 200,400(一般名:ホスフルコナゾール) <深在性真菌症治療在>

【併用禁忌】キニジン(硫酸キニジン)、ピモジド(オーラップ)

[これらの薬剤の血中濃度上昇により、QT延長、torsades de pointes 発現のおそれあり]

製造・販売中止のお知らせ

アロテック錠 10mg(一般名:オルシブレナリン硫酸塩) <喘息治療・気管支拡張剤>

2010年10月末日で販売中止

(英国において、本薬のシロップが臨床上的有用性よりも心臓系の有害事象発生リスクが上回るとして、2010年9月までに販売中止となったことより)

販売名変更のお知らせ

エボジン注シリンジ 12000(一般名:エボエチン) <遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤>

(現在)エボジン注シリンジ 12000 (新)エボジン皮下注シリンジ 12000

オキノーム散 0.5%(2.5mg/包)(一般名:オキシコドン塩酸塩水和物) <麻薬性鎮痛剤>

(現在)オキノーム散 0.5% (新)オキノーム散 2.5mg

院内副作用報告

2010年9月に報告された副作用

医薬品	副作用名
ティーエスワン cap	好中球減少、腎障害

穿刺針切り替えのお知らせ

「ダイアセンサー25 枚入」が「グルテストセンサー30 枚入」へ変更されるのに伴い、穿刺針「マルチレット 25 本入」を「ブラッドランセット 30 本入」へ変更します。いずれも使用中の測定器、穿刺器具を更新することなく、そのまま使用可能です。ダイアセンサーの在庫がなくなり次第、一斉に切り替えます（10月上旬頃の予定）。

投薬期間制限解除のお知らせ

アボルブ cap 0.5mg(一般名:デュタステリド) <5 還元酵素阻害薬 前立腺肥大症治療薬>
ラジレス錠 150mg(一般名:アリスキレンフマル酸塩) <直接的レニン阻害剤 高血圧治療薬>
レメロン錠 15mg(一般名:ミルタザピン) <ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤>
薬価収載から1年が経過したため、2010年10月1日から投薬期間制限(1回14日分)解除

形状変更のお知らせ

オイパロミン 300 注シリンジ 100mL(一般名:イオパミドール) <非イオン性尿路・血管造影剤>
薬剤注入時の安定性向上のため、プランジャー形状を変更



製造販売承認承継のお知らせ

パントシン錠 100,200,散 20%(一般名:パンテチン) <パンテチン製剤>
<2010年9月末日まで> <2010年10月1日以降>
製造販売元:第一三共株式会社 製造販売元:第一三共エスファ株式会社
販売提携:第一三共株式会社

使用期限変更のお知らせ

コペガス錠 200mg(一般名:リバビリン) <抗ウイルス剤>
【使用期限】3年 4年に延長
シンメトレル錠 50mg,100mg,細粒 10%(一般名:アマンタジン塩酸塩) <抗パーキンソン剤>
スローケー錠 600mg(一般名:塩化カリウム) <徐放性カリウム剤>
テグレート錠 100mg,200mg,細粒 50%(一般名:カルバマゼピン) <抗てんかん剤>
ポルタレン錠 25mg(一般名:ジクロフェナクナトリウム) <消炎解熱鎮痛剤>
リオレサル錠 10mg(一般名:バクロフェン) <中枢性骨格筋弛緩剤>
ルジオミール錠 25mg(一般名:マプロチリン塩酸塩) <四環系抗うつ薬>
【使用期限】5年 3年に短縮
ミドリン P 点眼液 10mL(一般名:トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩) <散瞳薬>
【使用期限】3年 2.5年に短縮
メテルギン錠 0.125mg(一般名:メチルエルゴメトリンマレイン酸塩) <女性性器疾患治療剤>
【使用期限】4年 3年に短縮