



棚卸の実施について

すでに、契約第二係よりお知らせがありましたように、平成28年3月31日に棚卸が実施されます。経営効率を高めるため、可能な限り在庫の常備薬を使用して下さい。薬剤部においても3月末には在庫数を限りなく0に近づける予定です。中止薬等ありましたら早めに返却して下さい。なお**在庫不足により薬の供給が遅れることがあります**が、ご協力をお願いします。

薬物血中濃度測定に関するお知らせ

★薬物血中濃度の測定業務を検査部に移行します

2016年4月から薬物血中濃度の測定業務はすべて検査部へと移行されます。血中濃度の解析は薬剤部でこれまで通り行いますので、解析結果については引き続き薬剤部へお問い合わせください。

★バンコマイシン血中濃度採血が投与直前の1点のみになります

これまでバンコマイシンの採血は投与前（トラフ値）、後（ピーク値）の2点で実施しておりましたが、日本化学療法学会/日本TDM学会のガイドラインの記載では、ピーク値の測定については必ずしも実施する旨の記載がなされておりません。そこで、この基準に合わせてバンコマイシンの測定を投与直前の1点のみへと変更させていただきます。

★臭化カリウムの血中濃度測定を中止します

現在、測定中の「臭化カリウム」の血中濃度が以下の理由により継続的に測定することができなくなります。

- (1) 薬剤部の測定機器は購入から数十年経過しており、耐容年数を超えている。
- (2) 「臭化物」の濃度測定は外注化では対応できない（「臭化物」の測定件数が非常に少ないため、検査会社で測定していない）。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い致します。ご不明な点がありましたら薬剤部研究室（TEL 2671）までご連絡下さい（開始日：2016年4月1日）。

後発医薬品へオード変更のお願い

3/15より、ヴィーンF、ドルミカム（先発医薬品）がソルアセットF、ミダゾラム（後発医薬品）へ変更になっております。4月以降ヴィーンF、ドルミカムで入力されている予定注射がありましたら、3月末までに後発医薬品へオード変更をお願い致します。ご協力よろしくお願い致します。

新規採用常備医薬品等のお知らせ

平成28年3月11日に開催された薬事委員会において、新規常備医薬品21品目、切り替え医薬品10品目、追加医薬品4品目、医療器具4品目、削除医薬品22品目が承認されました。平成28年4月8日（木）からオード開始予定（詳細は別紙参照）。

投与中止となった注射薬の返却について

投与中止となった注射薬の返却によるトラブルが発生しています。具体例として、以下のようなものがあります。

- (1) 「ヘパリン」等の文字が油性マジックで直接ボトルに書かれている（写真1）
- (2) ボトルが開栓済み、点滴刺入部のフィルムが取れている（写真2）
- (3) 輸液に薬剤が混注されている
- (4) 使用済みのバイアル、アンプル、針が紛れている（写真3）

開封済みの再利用できない薬剤は病棟で廃棄し、中止薬に書いた文字は消して下さい。特に(4)については針刺し事故等が起こる危険性がありますので、返却しないようご注意ください。



(写真 1)



(写真 2)



(写真 3)

使用済み

医薬品・医療機器等安全性情報 No. 331

★「小児と薬」情報収集ネットワーク整備事業について

小児に用いられる医薬品の情報収集・評価の体制強化を目指した小児医療情報収集システムについて紹介する。

★重要な副作用等に関する情報

以下の医薬品の使用上の注意のうち重大な副作用について、改訂内容等を紹介する。

◎エリブリンメシル酸塩（商品名：ハラヴェン静注1mg）＜抗悪性腫瘍剤＞

【重大な副作用】皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）、多形紅斑…十分観察、異常が認められた場合は投与中止、適切な処置。

※皮膚粘膜眼症候群：2例（うち死亡0例） ※多形紅斑：0例 （平成24年4月～平成27年12月）

医薬品・医療機器等安全性情報は、医薬品医療機器情報提供ホームページ（<http://www.pmda.go.jp/>）又は厚生労働省ホームページ（<http://www.mhlw.go.jp/>）からも入手可能。

適正使用のお知らせ

◎ケナコルトA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL（商品名：トリアムシロンアセトニド）＜合成副腎皮質ホルモン剤＞

※筋肉内注射時の注意とお願い

筋肉内注射による皮膚陥没の事例が報告されています。患者さんに以下の注意事項を説明して下さい。

- ・筋肉内注射時には、注射液が脂肪層に逆流し、萎縮による皮膚陥没を起こすことがあります。患者さんに対して、このことをあらかじめ説明して下さい。
- ・注射部位をもまないように患者さんにご指導ください。なお、注射部位をもまない場合でも萎縮による陥没が起こることがあります。

効能効果追加のお知らせ

◎イーケプラ錠250mg,500mg,ドライシロップ50%(一般名:レベチラセタム)＜抗てんかん剤＞

【効能・効果】他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の強直間代発作に対する抗てんかん薬との併用療法

◎エビリファイ持続性水懸筋注用400mg(一般名:アリピプラゾール水和物)＜持続性抗精神病薬＞

【用法・用量】臀部筋肉内又は三角筋内に投与。

◎オブジーボ点滴静注20mg,100mg(一般名:ニボルマブ(遺伝子組換え))＜抗悪性腫瘍剤＞

【用法・用量】化学療法未治療の根治切除不能な悪性黒色腫患者の場合:1回3mg/kgを2週間間隔で点滴静注。化学療法既治療の根治切除不能な悪性黒色腫患者の場合:1回3mg/kgを2週間間隔又は1回2mg/kgを3週間間隔で点滴静注。

◎ネクサパール錠200mg(一般名:ソラフェニブトシル酸塩)＜抗悪性腫瘍剤＞

【効能・効果】根治切除不能な甲状腺癌

◎ハラヴェン静注1mg(一般名:エリブリンメシル酸塩)＜抗悪性腫瘍剤＞

【効能・効果】悪性軟部腫瘍

◎リツキサン注10mg/mL(一般名:リツキシマブ(遺伝子組換え))＜抗CD20モノクローナル抗体＞

【効能・効果】ABO血液型不適合腎移植・肝移植における抗体関連型拒絶反応の抑制

【用法・用量】1回375mg/m²を点滴静注(適宜減量)。

◎イムラン錠50mg(一般名:アザチオプリン)＜免疫抑制剤＞

【禁忌】本剤成分又はメルカプトプリン過敏症、トピロキソスタット投与中

販売移管のお知らせ

	変更前		変更後
パリエット錠 10mg	製造販売元: エーザイ株式会社	→	製造販売元: エーザイ株式会社 販売元: EA ファーマ株式会社 (2016年4月1日)
セルベックス細粒 10%			
リーバクト配合顆粒	製造販売: 味の素製薬株式会社	→	製造販売元: EA ファーマ株式会社 (2016年4月1日)
リーバクト配合経口ゼリー			
エレンタール配合内用剤			
エレンタール P 乳幼児用配合内用剤			
ニフレック配合内用剤			
モビプレップ配合内用剤			
アルギU配合顆粒<緊急購入薬>			
レンチナン静注用 1mg 「味の素」			
テレミンソフト坐薬 2mg			
プロクトセディル軟膏			
強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ 20mL	製造販売元: 株式会社ミノファーゲン製薬 販売元: エーザイ株式会社	→	製造販売元: 株式会社ミノファーゲン製薬 販売元: EA ファーマ株式会社 (2016年4月1日)
グリチロン配合錠			
リパクレオンカプセル 150mg	製造販売元: マイラン EPD 合同会社 販売元: エーザイ株式会社	→	製造販売元: マイラン EPD 合同会社 販売元: EA ファーマ株式会社 (2016年4月1日)

名称変更のお知らせ

商標移管に伴い変更予定。

- ・イソジンゲル10% →ポビドンヨードゲル10%「明治」(一般名：ポビドンヨード)＜外用消毒剤＞
- ・イソジンシュガーパスタ軟膏 →メイスパン配合軟膏(一般名：ポビドンヨード)＜褥瘡・皮膚潰瘍治療剤＞

錠剤変更、包装変更等のお知らせ

◎フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(一般名：フルニトラゼパム)＜睡眠導入剤＞

錠剤変更：白色～微黄白色の割線入り素錠 →帯青白色の割線入りフィルムコーティング錠(内核は青色錠)

※飲料等に入れた際、色調が変化するように青色の着色剤を添加(厚生労働省からの悪用防止対策要請による変更)。

◎パム静注500mg(一般名：プラリドキシムヨウ化物)＜有機リン剤中毒解毒剤＞

アンプルラベルのデザイン変更。

オーダ中止のお知らせ

オーダ中止日	薬剤名	理由
2016. 3. 17	エンピナス・P 錠 18000	販売中止のため
	ノイチーム顆粒 10%	

☆Drug Safety Update No. 247 より使用上の注意改訂のお知らせ

改訂内容の重要度 ★：最重要 ※：重要

成分名(薬品名)	主な改訂内容
メチルフェニデート塩酸塩 (コンサータ錠〈院外限定〉、 リタリン錠)	※重大な副作用：肝不全、肝機能障害 …肝不全(急性肝不全等)、肝機能障害があらわれることがあるので、十分観察、異常が認められた場合には投与中止、適切な処置。
エソメプロラゾールマグネシウム水和物 (ネシウムカプセル)	※重大な副作用：横紋筋融解症 …十分観察、筋肉痛、脱力感、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇等があらわれた場合には、投与中止、適切な処置。
エリブリンメシル酸塩 (ハラヴェン静注)	※重大な副作用：皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、多形紅斑 …十分観察、異常が認められた場合には投与中止、適切な処置。
エンテカビル水合物 (ハラクルート錠)	※重大な副作用：肝機能障害 …本剤での治療中にAST(GOT)、ALT(GPT)が上昇することがある。AST(GOT)、ALT(GPT)の上昇が認められた場合、より頻回に肝機能検査を行うなど、十分観察。検査値等の経過から、肝機能障害が回復する兆候が認められない場合には、投与中止、適切な処置。

※DSUについて：最重要、重要な情報を掲載しています。その他詳細情報については、医薬品・医療機器情報提供ホームページ(<http://www.pmda.go.jp/>)で確認可能

①新規常備依頼医薬品 (合計21品目)

商品名	剤形	規格	薬価	会社名	成分・薬効
イフェクサーSR 117	Cap	37.5mg 75mg	160.8 270.7	ファイザー	Venlafaxine Hydrochloride うつ病・うつ状態治療薬 ★セロニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤 ★米国、カナダ等のがイドラインにて推奨度高い ★従来薬と比較して有用性の高いエビデンス 【発売: 2015.12.8】
ヴィキラックス配合 625	錠	オムビタスビル 12.5mg/パリタプレ ビル75mg/リトナビル 50mg	26,801.2	アッガイ	Ombitasvir Hydrate, Paritaprevir Hydrate, Ritonavir 抗ウイルス化学療法剤 ★ジェノタイプ1C型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変に対して経口薬のみで12週間治療可能 ★ウイルス学的持続著効率95% (薬剤耐性変異ない場合: 99%と従来薬: ハーボニー配合錠と同等) ★従来薬の禁忌である腎機能低下症例 (eGFR30以下) に使用可能 ★従来薬12週薬価: 6,734,389.2と本剤12週薬価: 4,502,601.6と経済的 【発売: 2015.11.26】
エクリラジエヌエア30吸入 225	吸入	400 µg	3,150.9	杏林	Aclidinium Bromide 長時間作用性吸入気管支拡張剤 ★長時間作用性抗コリン薬 (LAMA) ★吸入デバイスがボタンを押すだけの1アクション、カラーサインによる吸入確認可能→コンプライアンス向上 【発売: 2015.5.20】
オフェブ 399	Cap	100mg 150mg	4,382.90 6,574.40	ベーリン ガーインゲ ルハイム	Nintedanib Ethanesulfonate チロシナーゼ阻害剤 ★抗線維化剤 ★特発性肺線維症 (IPF) は難病指定されている特定疾患の治療薬 ★IPFに対する初の分子標的薬 ★内服患者の高頻度に悪心、下痢、肝機能障害の副作用が出現し休薬や減量を必要とする割合が高い→100mg製剤必要 【発売: 2015.8.31】
オプスミット 219	錠	10mg	14,594.0	アクテリオン	Macitentan 肺動脈性肺高血圧症治療薬 ★エンドセリン受容体拮抗薬 ★肺動脈性肺高血圧症 (PAH) 患者におけるmorbidity/mortalityの発現を主要評価項目として長期の有効性が確認された世界初のPAH治療薬 ★他の同効薬の1日薬価 (トラクリア: 17,980、ウオリアリス: 20,201.2) と比較して経済的 【発売: 2015.6.9】
ガドピスト静注1.0mol/Lシ リンジ 729	注	5mL 7.5mL	5,114 7,457	ハイエル	Gadobutrol 非イオン性MRI用造影剤 ★T1緩和能が高く、優れた造影効果を示す ★高濃度製剤→注入速度遅くできる→血管脆弱患者への負担軽減 ★キレート安定性の高いマクロ環構造のため、腎性全身性線維症「NSF」の発症リスク低い 【発売: 2015.6.30】
カピステン筋注 114	注	50mg/2.5mL	128.0	キッセイ	Ketoprofen 注射用鎮痛・解熱・抗炎症剤 ★NSAIDs筋注製剤 ★NSAIDs静注製剤 (ロピオン: 薬価239) と比較して経済的 【発売: 2006.12.19】
ガイヤフレックス注射用 290	注	0.9mg	119.1	旭化成	Collagenase (Clostridium Histolyticum) デュロトラン拘縮治療剤 ★手術と比較して低侵襲で治療効果が高い 【発売: 2015.9.16】

スピオールレスピマット28吸入 229	吸入	チオトロピウム2.5 μg / オロダテロール2.5 μg	4,256.9	ペーリン ガーインゲ ルハイム	Tiotropium Bromide Hydrate / Olodaterol Hydrochloride COPD治療配合剤 ★長時間作動型β2刺激薬オロダテロールと長時間作用型抗コリン薬チオトロピウムの配合剤 ★デバイスレスピマットであり、ソフトミスト→ドライパウダー製剤で嘔声や咳嗽出現患者に使用可能 【発売:2014.12.1】
トルリシティ皮下注アテオス 249	注	0.75mg/キット	3,586.0	大日本 住友	GLP-1 受容体作動薬 Dulaglutide (Genetical Recombination) ★週1回投与、単独、他剤併用共にHbA1c1.5%前後の低下効果→従来治療と比べ同等もしくは同等以上 ★デバイスは針の取り付け、薬剤の混和、空打ちが不要の1回使い切り製剤 【発売:2015.9.16.】
フルティフォーム50エアゾール 229	吸入	56吸入/本	2,753.0	杏林	Fluticasone Propionate / Formoterol Fumarate Hydrate 喘息治療配合剤 ★炎症を強力に抑えるフルチカゾンと気管支を速やかに広げるホルモテロールの配合剤 ★フルティフォーム125で治療開始し、気道炎症抑制で喘息治療のステップダウン→フルティフォーム50が必要 ★pMDI製剤 【発売:2014.12.1.】
ベピオケル 269	外用	2.5%15g/本	1,813.5	マルホ	Benzoyl Peroxide 尋常性ざ瘡治療剤 ★抗菌作用と抗炎症作用を併せ持つ 【発売:2015.4.1】
マリセブ 396	錠	12.5mg 25mg	599.2 1,045.1	MSD	Omarigliptin 持続性選択的DPP-4阻害剤 ★週1回服用のDPP4阻害薬 ★透析中を含め、重度腎機能障害のある患者に使用可能 【発売:2015.11.26】
ライゾテグ配合フレックスタッチ 331	注	インスリンアスパルト90 単位:インスリンテグ ルテグ210単位/ 本	2,322/本	ノボル ディスク	Insulin Degludec (Genetical Recombination) : Insulin Aspart (Genetical Recombination) 糖尿病治療薬 ★懸濁不要 ★国際共同試験において従来の混合型インスリン製剤と比較して空腹時血糖値の改善及び夜間低血糖の発現頻度を高めない 【発売:2015.12.1.】
レルベア200エリプタ30吸入 229 レルベア100エリプタ30吸入 229	吸入	ビランテロール25 μg / フルチカゾンフランカル ボン酸エステル200 μg ビランテロール25 μg / フルチカゾンフランカル ボン酸エステル100 μg	7269.80 6313.50	グラク スミ クライン	Vilanterol Trifenatate / Fluticasone Furoate 吸入喘息治療配合剤 ★長時間作動型β2刺激薬ビランテロールと吸入ステロイド薬フルチカゾンフランカルボン酸エステルの配合ドライパウダー剤 ★フルチカゾンフランカルボン酸エステルは持続的で高い抗炎症効果→患者QOL向上 ★吸入デバイス1アクション、吸入残数が赤字表記→コンプライアンス向上 ★レルベア200で治療開始し、気道炎症抑制で喘息治療のステップダウン→レルベア100が必要 【発売:2014.12.1】
ワントラム 114	錠	100mg	119.1	ファイザー	Tramadol Hydrochloride 持続性がん疼痛・慢性疼痛治療剤 ★24時間安定した血中濃度維持→持続した鎮痛効果 ★1日1回→服薬コンプライアンス向上 ★トラマルOD錠25mg4錠(薬価:154.4)を比較して経済的 【発売:2015.6.2】

②切り替え医薬品 (合計10品目)

商品名	剤形	規格	薬価	会社名	成分・薬効
アレセンサ 429	Cap	150mg	6,614.6	中外	Alectinib Hydrochloride 抗悪性腫瘍剤/ALK阻害剤 ★従来品1回服用量8個(20mg:1個、40mg:7個) → 1回服用量2個(150mg)→服薬の負担軽減→利便性向上 ★従来品1日薬価:26,498 → 150mg製剤1日薬価:26,458.4と経済的 【発売:2015.12.5.】

オルメテックOD 214	錠	20mg	123.3	第一三 共	Olmesartan Medoxomil ★水なしで服用可能な口腔内崩壊錠 ★通常錠と同薬価 【発売:2015.12.14.】
ゲムシタビン点滴静注液「 ホスピーラ」 422	注	200mg 1000mg	1,825 12,649	持田製 薬	Gemcitabine Hydrochloride 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤 ★溶液製剤 → 薬剤調製時間短縮 → 薬剤曝露の危険性を軽減 ★薬剤曝露防止包装(オンコテイン) 【発売:2015.12.1.】
サトスタチンLAR筋注用 キット 249	注	20mg 30mg	221,913 312,396	ノバルティ ス	Octreotide Acetate 持続性ソマトスタチンアナログ ★キット製剤 → 調製時間短縮、清潔、利便性の向上 ★バイアル製剤18あるいは19G針→キット製剤20G針→患者負担 軽減 ★バイアル製剤と同薬価 ★10mg製剤は緊急購入で対応 【発売:2014.6.30.】
シプロキシサン注 624	注	400mg/200mL	2,404.0	富士フイル ムファーマ	Ciprofloxacin ニューキノロン系注射用抗菌剤 ★ニューキノロン系薬の有効性、及びそれに対する細菌の耐性化 は、AUC/MICあるいは、Cmax/MICと相関 → 1回投与量ある いは1日投与量を増大 → 有効性、耐性菌出現抑止効果が 上昇 ★従来品(シプロキシサン注300mg)と同薬価 【発売:2015.12.21.】
ノイート静注用 634	注	500単位	28,972	日本血 液製剤 機構	Freeze-dried Concentrated Human Antithrombin III 血液凝固阻止剤 ★製造メーカーの問題で従来品(アンソロンP500単位)が安定 供給できない 【発売:1987.6.15.】
メルトンM 253	錠	0.125mg	9.9	持田製 薬	Methylergometrine Maleate 子宮収縮止血剤 ★従来品(メテルギン錠)の販売中止 ★1974年から使用 → 使用経験多い 【発売:1994.12.1.】
モーラスパップXR 264	外用	120mg	43.7/枚	久光	Ketoprofen 経皮鎮痛消炎剤 ★パップ製剤で唯一「腰痛症」「関節リウマチにおける関節局所の 鎮痛」の効能効果を有する ★従来薬(モーラスパップ30mg)と比較して粘着性向上 ★従来薬(1日2回)→本剤(1日1回) 【発売:2015.12.15.】

③追加医薬品 (合計4品目)

商品名	剤形	規格	薬価	会社名	成分・薬効
イーケプラ点滴静注 113	注	500mg	1,978.0	大塚製 薬	Levetiracetam 抗てんかん薬 ★一時的に経口投与ができないてんかん患者に対する、部分 発作の治療薬 ★経口剤と同じ1日用量及び投与回数で臨床推奨用量から治 療可能 ★pH:5-6、浸透圧比(生理食塩液に対する比):約3→血管への 刺激、循環器系への影響ともに少ない 【発売:2015.12.1.】
クレストール 218	錠	5mg	131.5	アストラゼ ネカ	Rosuvastatin Calcium ★心血管イベント高リスク患者において、従来以上の脂質低下療 法により心血管プラークの進展抑制・心血管イベント抑制につな がること報告されており、標準治療となっている→2.5mg錠を2 錠以上処方→コンプライアンス不遵守、患者負担増大→5mg錠が必 要 【発売:2005.4.27.】
ストラテラ 117	内用液	0.40%	209.2/m L	イーライリ リー	Atomoxetine Hydrochloride ★ストラテラカプセルは脱カプセルできない → カプセル製剤が服用で きない患者に使用可 ★用量調節が容易 【発売:2013.11.29.】

生食注シリンジ「オーツカ」 331	注	20mL	134.0	大塚製 薬工場	Sodium Chloride Solution, Isotonic ★プレフィルドシリンジ製剤→調製時間短縮・清潔 ★後発医薬品 ★生食20mL:薬価61円 → 手術時のみに使用で経済的 【発売:2009.1.13.】
----------------------	---	------	-------	------------	--

④医療器具（合計4品目）

商品名	剤形	規格	薬価	会社名	成分・薬効
グルテストNeoセンサー	センサー	30枚/箱	140/枚 (定価)	三和化 学	自己血糖測定用センサー ★補正操作が不要 ★酸素分圧の影響を受けない ★マルトース、ガラクトース、イコネキストリンの影響を受けない ★ヘマトクリット値20-70%の範囲で測定値に影響を受けない
ナノパスニードルⅡ	針	34GX4mm	—	テルモ	ヘン型注入器用注射針 ★世界で最も細い外径34G、左右非対称の先端刃面構造→刺痛抵抗少ない→自己注射患者の痛み軽減、QOL向上
ワンタッチアクロランセット	針	33G	—	ジョンソ ン	自己血糖測定用穿刺針 ★従来品(ワンタッチヘンランセット)30G→本品33G→痛み軽減 ★穿刺に失敗した場合、再穿刺可能
ワンタッチペリオセンサー	センサー	30枚/箱	—	ジョンソ ン	自己血糖測定用センサー ★従来品(LFSクイックセンサー)と比較して血液量が半分以下 ★従来品の価格と比較して1箱あたり250円安価

⑤新薬申請時に挙げられた削除可能医薬品（合計11品目）

商品名	剤形	規格	削除理由
アホコート	軟膏	5g/本	ベピオゲル採用のため、削除
カバサル	錠	0.25mg 1.0mg	ワントラム錠採用のため、後発品へ変更可
カルデナリン	錠	1mg 2mg	イフェクサーSRCap採用のため、後発品へ変更可
ジェムサル	注	200mg 1000mg	ゲムシタピン点滴静注「ホスピール」200mg・1000mg採用のため、削除
セロケンL	錠	150mg	クレストール5mg採用のため削除(第二内科限定で緊急購入)
ピレスパ	錠	200mg	オフエプCap150・100mg採用のため、削除(呼吸器感染症内科限定で緊急購入)
フェロペリン配合	錠	—	マリセブ錠12.5・25mg採用のため、削除
レベミル	注	300単位/本	ライゾテック配合注フレックスタッチ採用のため、削除(第三内科限定で緊急購入)

※削除可能医薬品は、全診療科に確認を行い、診療、治療上問題のない場合、削除します。あるいは、特定の診療科で問題のある場合、「診療科限定」に登録します。(注:「診療科限定」は原則、在庫しない医薬品です。)

⑥削除医薬品（合計22品目）

商品名	剤形	規格	削除理由
(院)アミノフィリン	散	10mg/g	レスピア経口・静注液採用のため、削除
アレセンサ	Cap	20mg 40mg	アレセンサCap150mg採用のため、削除
アンソロピンP	注	500単位	ノアート静注用500単位採用のため、削除
LFSクイックセンサー	—	—	ワンタッチペリオセンサー採用のため、削除
オルメテック	錠	20mg	オルメテックOD錠20mg採用のため、削除
グルテストセンサー	—	—	グルテストNeoセンサー採用のため、削除
ゲムシタピン「タイハウ」	注	200mg 1000mg	ゲムシタピン点滴静注「ホスピール」200mg・1000mg採用のため、削除
サンドスタチンLAR筋注用 パイアル	注	10mg 20mg 30mg	サンドスタチンLAR筋注用キット採用のため、削除
シプロキサ	注	300mg/150mL	シプロキサ注400mg/200mL採用のため、削除
ストラテラ	Cap	5mg	ストラテラ内用液0.4%採用のため、削除
マイクロファイブラス	針	32GX4mm	ナノパスニードルⅡ(34GX4mm)採用のため、削除
マグネスコブシリンジ	注	10mL	ガトビスト静注1.0mol/Lシリンジ5・10mL採用のため、削除
マグネビストシリンジ	注	15mL	
メテルキン	錠	0.125mg	販売中止のため、削除
モーラスハップ	貼付	30mg	モーラスハップXR120mg採用のため、削除
ワンタッチヘンランセット	針	—	ワンタッチアクロランセット採用のため、削除