


オキノーム[®]散の飲み方


このお薬には痛みをやわらげる成分が含まれています。
裏面の注意事項を守って正しくお飲みください。

スティック包装の開け方

- ①裏側の折り返し部分を指で押さえながら…



- ②「切り口」と表示されているところから、矢印にそって、封を切ってください。
こぼさないように注意してください。



水などに溶かして飲む場合

水などを入れたコップの中に
1回に飲む量のお薬を入れて、
溶かして飲んでください。
溶かしたお薬はすぐに飲んで
ください。



*お薬 1包を溶かすには、10mL の水があれば十分です。
溶かした後の水は白く濁っていますが、お薬の主成分
はすべて溶けています。

このお薬には、「決められた時間に定期的に飲む場合」と「痛いときに臨時で飲む場合」の二通りがあります。医師、薬剤師の指示にしたがつて正しくお飲みください。

- このお薬を「痛いときに臨時で飲む場合」には以下の点に注意してください。
 - ① 飲んでから 1 時間以上たっても痛みが軽くならないときは、我慢しないでもう 1 回飲んでください。
 - ② 1 日に飲む回数が増えたときは、そのことを医師、薬剤師に伝えてください。
- 他の人には、絶対にあげないでください。
- 医師の指示なしに、ご自分の判断で 1 回に飲むお薬の量を増やしたり減らしたり、あるいはお薬をやめたりしないでください。
- 眠気やめまいがあらわれることがありますので、このお薬を飲んでいる間は、車の運転などの危険を伴う作業は避けてください。
- 飲酒はできるだけ控えてください。
- 便秘、吐き気、眠気などがあらわれることがあります。これらを含めて気になる症状があらわされたときはすぐに医師、薬剤師に相談してください。
- お薬は、お子様の手の届かないところに保管してください。
- 光、湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- このお薬を輪ゴムで束ねたり、袋を折り曲げたりしないでください。
- いらなくなつたお薬は、病院または薬局に返却してください。





提携

ムンディファーマ B.V.



製造販売元【資料請求先】

シオノギ製薬

大阪市中央区道修町3-1-8 〒541-0045

電話 0120-956-734 (医薬情報センター)

<http://www.shionogi.co.jp/med/>

®:オキノームは登録商標です。

®: OXINORM is a Registered Trademark

OXN-C-1(D1) 審 31622

2011年6月作成