

# 薬剤部だより No.170

山口大学病院薬剤部


2004.3.15.

## 散剤分包紙印字サービスの対象診療科を拡大しました

入院患者さんを対象に実施している散剤分包紙印字サービスを、新たに3月8日から1-8 東病棟(皮膚科) 3月15日から1-8 西病棟(眼科、歯科口腔外科)にも拡大しました。このサービスを利用するには以下の注意が必要です。

\* 散剤分包紙に印字されている薬品名のmgはその薬剤の規格単位を表しており、決して、分包量(投与量)ではありません!

\* 抗癌剤や吸湿性の高い薬剤など機械にかけられない薬剤には印字出来ません!



## メルカゾール錠服用中の患者さんへ副作用情報提供を開始しました

メルカゾール錠で「無顆粒球症」の副作用(死亡例あり)が報告されています。これに伴い、3月1日からメルカゾール錠を服用中の患者さんに上記副作用の初期症状についての注意を喚起したカラーイラスト入り説明文書の提供を開始しました。

山大 太郎 様

次のような症状にご注意ください

メルカゾール服用中の患者さんへ

熱が出る



発熱

全身倦怠感



だるい・倦怠感

のどが痛む



咽頭痛

以上のような症状があらわれたら、**速やかに**医師または薬剤師にお知らせください。本剤投与中は少なくとも投与開始後2ヵ月間は、原則として**2週に1回、それ以降も定期的に血液検査を受けてください。**

## 医薬品販売中止・オーダ中止のお知らせ

- ・「コルヒチン錠」が販売中止にともない、在庫がなくなりしだい削除となります。
- ・「ベノキシールゼリー」が販売中止にともない、3月末日で削除となります。
- ・「トブラシン注60mg」「トブラシン注小児用10mg」は4月1日より販売元が当院と取引のないメーカーに変更され、継続的な医薬品情報の提供が見込めなくなったため、在庫がなくなりしだい削除となります。

## 高濃度カリウム製剤及び10%キシロカイン製剤に注意喚起を開始

薬剤部だより No.169 でもお知らせしましたが、高濃度カリウム製剤及び10%キシロカイン製剤の医療事故防止のため、2月18日から注射処方箋の薬品名横へ以下のように押印を開始しました。

高濃度カリウム製剤	希釈して使用すること。
10%キシロカイン製剤	点滴静注すること。

## 院内製剤の使用はIC（インフォームドコンセント）を実施の上、ご請求をお早めに!!

院内製剤は、市販製剤では十分な効果が得られない症例に用いるため、時間と労力をかけて薬剤部で調製している製剤です。試薬（医療用医薬品でない）を原料とするものや保険適応外使用となるものが多くあります。また、有効性や安全性などのエビデンスも十分ではなく、長期の安定性も保証できないため、使用に際しては以下の点にご注意ください。

有益性及び危険性を十分に検討し、患者にインフォームドコンセントを行うこと。

外来患者では次回使用予定日を処方箋に記入するなどして、患者の待ち時間短縮、業務の効率化にご協力ください（院内製剤は原則作り置きをしません）

## 選定療養及び特定療養費に係る医薬品の情報提供文書作成中

薬価基準に記載されている医薬品で、保険診療（薬事法に基づく承認）において承認された用法等と異なる用法等で使用される場合、保険適用外となり、患者さんの全額負担となります〔これまで、支払基金及び国保連合において、一部保険診療扱いで成りたっていた〕。その際、用法・用量、効能又は効果、副作用及び相互作用等を患者さんに十分説明する必要がありますので、これらの情報提供文書を現在薬剤部で作成中です。なお、当院で対象となる医薬品の効能・効果は以下の表のとおりです。

一般名(成分名)	販売名	効能・効果
プレオマシシ	プレオ 5mg	精巣腫瘍
	プレオ 15mg	
	プレオ 30mg	
塩酸セレギリン	エフピー錠 2.5	パーキンソン病( Yahr 重傷度ステージ ~ )
イホスファミド	注射用イホマイド 1g	精巣腫瘍 他の抗腫瘍剤と併用する
アスピリン	バイアスピリン錠 100mg	川崎病 急性期( 有熱期間 ) 及び解熱後から慢性期( 心血管後遺症のある場合 )
塩酸モルヒネ	塩酸モルヒネ注射液「三共」 10mg	硬膜外に注射する場合 硬膜外に持続注射する場合( 精密持続含む )
	塩酸モルヒネ注射液「三共」 50mg	
塩酸エフェドリン	エフェドリン「ナガイ」注射液 40mg	麻酔管理時の血圧低下 ( 脊椎麻酔時の血液降下からの変更 )
アザチオプリン	イムラン錠	他の標準的な第 1 選択療法では効果が得られない 副腎皮質ステロイド離脱が困難な患者でクローン病 又は潰瘍性大腸炎を有する患者の緩解導入及び緩解維持
塩酸セフェピム	注射用マキシピーム 1g	好中球減少に伴う発熱のエンピリックセラピー

