

薬剤部だより No.173

山口大学病院薬剤部

2004.6.17.

正しい服用時間の記載をお願いします

先日行われた厚生労働省・県特定共同指導で、処方箋の記載について、「エビデンスに基づいた服用時間(添付文書上の用法)にしたがって処方するように。」との指摘がありました。処方時にはご注意ください。

<誤> ベイスン錠 0.2 3T 3×食前

<正> ベイスン錠 0.2 3T 3×**食直前**

<誤> エパデール S600 3包 3×食後

<正> エパデール S600 3包 3×**食直後**

現在のシステムでは、食直前、食直後での入力できませんが、次期システム(8月稼働開始)では入力可能となります。


なお、処方箋の最後には「以下余白」と記載すること(改ざん防止の為)も併せて注意を受けています。コンピュータオーダされた処方箋では自動的に「以下余白」が記載されますが、手書き処方箋では忘れずに記載して下さい。

10%リドカイン製剤、高濃度カリウム製剤が薬剤部管理になりました

10%リドカイン製剤<点滴用キシロカイン 10%(1000mg/10mL)>、高濃度カリウム製剤<K.C.L 注射液(1号)[40mEq/20mL/A]>の誤投与防止のため、「心血管外科専門医認定機構」から、救急カート、救急部を含む全外来、病棟から撤廃するよう緊急通告が届きました。これにより、上記薬剤につきましては薬剤部が管理し、処方箋調剤により払い出すことになりました。

ワーファリン、強心薬を服用中の患者さんに情報提供を開始しました

患者さんの安全に役立つ調剤を徹底するため、糖尿病用薬だけでなく、ワーファリン、強心薬(ジギタリス製剤)が処方された全患者さんを対象に、情報提供を開始しました。また、薬袋には「ワーファリンが入っています。」「強心薬が入っています。」と印字させています。




カルデナリン錠服用中の患者さんへ副作用情報提供を開始しました

カルデナリン錠で「肝炎、肝機能障害、黄疸」等の重大な副作用が報告されています。これに伴い、6月1日からカルデナリン錠を服用中の患者さんに上記副作用の初期症状についての注意を喚起したカラーイラスト入り説明文書の提供を開始しました。

山大 太郎 様

次のような症状にご注意ください

カルデナリン服用中の患者さんへ



だるい・力が入らない

吐き気がある・食欲がない・だるい

白目が黄色くなった

尿の色が褐色になった

以上のような症状に気づいたら、速やかに医師または薬剤師に申し出てください。
山口大学医学部附属病院薬剤部


プレタール錠服用中の患者さんへ副作用情報提供を開始しました

平成15年4月に脳梗塞再発抑制の効能・効果が承認されて以降、プレタール錠を脳梗塞再発抑制に使用した患者で、関連性が疑われる「脳出血等の頭蓋内出血」が15例(うち死亡6例)が報告されています。これに伴い、6月15日からプレタール錠を服用中の患者さんに上記副作用の初期症状についての注意を喚起したカラーイラスト入り説明文書の提供を開始しました。

山大 花子 様

プレタール服用にあたって

・本剤との関連性が疑われる脳出血等の副作用が報告されています。副作用を予知するため以下のような症状にご注意ください。



頭痛がひどい

吐き気がある

発熱

以上のような症状に気づいたら、速やかに医師または薬剤師に申し出てください。副作用を予知するため血液凝固能検査等を受けるようにしてください。脳梗塞の既往のある患者さんでは、血圧の変動にもご注意ください。
山口大学医学部附属病院薬剤部

注射薬在庫見直しを近々行います

8月に稼働予定の次期システムでは、オーダ入力時に病棟在庫注射薬及びその定数が表示され、在庫の有無がわかるようになります。稼働日にあわせるため、毎年9月9日(救急の日)に行っている注射薬在庫の一斉見直しを、今年は7月上旬に行う予定です。日時が決まり次第、病棟在庫使用量一覧表および在庫薬品リストを送りますのでご協力をお願いします。

エレンタール、エレンタールPのフレーバーが変わります

エレンタール、エレンタールP専用フレーバーのうち、「抹茶味」と「アセロラ味」がなくなり、新たに「グレープフルーツ味」と「さっぱり梅味」が新しく追加になります。従来の「オレンジ味」、「パイナップル味」、「青りんご味」、「コーヒー味」、「ヨーグルト味」も飲みやすく改良されました。患者さんのコンプライアンス向上のためご利用ください。