

# 薬剤部だより No.225

山口大学病院薬剤部 2008.10.20



## 塩化ビニル製輸液セット・カテーテルと相互作用のある 当院採用注射剤リストを作成

当院採用の注射剤で塩化ビニル製輸液セット・カテーテルと相互作用のあるリストを作成しました。病棟での輸液セット・カテーテルの選択にご活用下さい。

商品名	一般名	薬効分類	相互作用
パクリタキセル「NK」	パクリタキセル	抗悪性腫瘍剤	DEHP 避ける
タキソール			DEHP 避ける
ラステット	エトポシド		DEHP 溶出 DEHP 避ける
イントラリピッド	-	脂肪乳剤	DEHP 溶出 DEHP 避ける
ケイツーN	メナテトレノン	ビタミン剤	DEHP 溶出 DEHP 避ける
ピタジェクト	-	中心静脈用 総合ビタミン剤	DEHP 溶出 DEHP 避ける
フルカリック 1,2,3号	-	高カロリー輸液	DEHP 溶出 DEHP 避ける
ディブリバン	プロポフォール	全身麻酔・ 鎮静剤	DEHP 溶出 DEHP 避ける
リピオドールウルトラ フルイド	ヨード化ケシ油脂肪酸 エチルエステル	造影剤	DEHP 溶出 DEHP 避ける
ロピオン	フルルビプロフェン アキセチル	鎮痛剤	DEHP 溶出 DEHP 避ける
アムビゾーム (緊急購入薬)	アムホテリシン B リポソーム製剤	抗真菌剤	DEHP 溶出 DEHP 避ける
リプル	アルプロスタジル	血管拡張剤	DEHP 溶出 PVC 避ける
ドルミカム	ミタゾラム	睡眠鎮静剤	吸着(乳酸リンゲル液と配合時 PVC 避ける)
アンカロン (緊急購入薬)	塩酸アミオダロン	抗不整脈剤	吸着 DEHP 溶出 PVC 避ける
サンディミュン	シクロスポリン	免疫抑制剤	吸着 DEHP 溶出 PVC 避ける
プログラフ	タクロリムス水和物		吸着 DEHP 溶出 PVC 避ける
ニトロール	硝酸イソソルビド	降圧剤・ 狭心症治療剤	吸着
ミオコール	ニトログリセリン		吸着
ミスロール			吸着

PVC:ポリ塩化ビニル(polyvinyl chloride)、DEHP:フタル酸ジ-(2-エチルヘキシル)  
[di-(2-ethylhexyl)phthalate]

## 10月からRIの薬品管理開始

RIに在庫してあった20品目について薬剤師巡回による薬品管理を始めました。

## 酸化マグネシウム製剤における重篤な高マグネシウム血症(死亡例を含む)

国内において、酸化マグネシウム製剤による重篤な高マグネシウム血症が25例報告(そのうち死亡4例)されています。長期にわたり投与する場合や高マグネシウム血症が疑われる症状(悪心・嘔吐、口渇、血圧低下、徐脈、皮膚潮紅、筋力低下、傾眠等)が発現した場合には、血清マグネシウム濃度の測定を行うなど十分な観察を行って下さい。

## ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg「日医工」オーダ可能に

DI月報 No.253 でお知らせしたように、「ミノマイシン点滴静注用 100mg」が供給停止となったため、代替としてミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg「日医工」を採用し、11月5日からオーダ開始します。

## デュロテップパッチ(リザーバー製剤)供給中止

デュロテップパッチ(経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤)が2009年3月末を以って供給中止となります。これに伴い、薬剤部では改良型製剤デュロテップMTパッチ(当院未採用)への切替を検討しています。

## ペン型インスリン製剤等の使用注意喚起

医療機関で個人使用専用であるペン型インスリン注入器の複数患者への使用事例が報告されたことに伴い、厚生労働省から、以下のような通知が出されました。

### 『1本の製剤を複数の患者に使用しないこと』

1本の製剤を複数患者に使用すると、毎回新しい針に取り替えた場合でも、カートリッジ内への血液混入等により、感染の原因となるおそれがあります。

## 削除薬のお知らせ

- ・「MSコンチン錠 60 mg」の在庫がなくなったため、10月3日でオーダ中止。
- ・「アルドメット錠 250 mg」の販売元変更のため、11月28日でオーダ中止予定。

## パルミコート 200 タービュヘイラー56 吸入のオーダ名変更

「パルミコート 200 タービュヘイラー」に56、112(当院未採用)吸入の2規格が存在していました。これらを区別するために、「パルミコート 200 タービュ 56」へ10月3日より変更しました。

## 平成21年度薬剤部研修生採用試験を実施します

平成21年度薬剤部研修生採用試験を10月20日(月)に実施します。受験者は5名です。