

ツムラ医療用漢方製剤一覧

1 ツムラ葛根湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-1]

〔効能又は効果〕
自然発汗がなく頭痛、発熱、悪寒、肩こり等を伴う比較的体力のあるものの次の諸症：感冒、鼻かぜ、熱性疾患の初期、炎症性疾患（結膜炎、角膜炎、中耳炎、扁桃腺炎、乳腺炎、リンパ腺炎）、肩こり、上半身の神経痛、じんましん
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

2 ツムラ葛根湯加川芎辛夷
エキス顆粒(医療用) [TJ-2]

〔効能又は効果〕
鼻つまり、蓄膿症、慢性鼻炎
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

3 ツムラ乙字湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-3]

〔効能又は効果〕
病状がそれほど激しくなく、体力が中位で衰弱していないものの次の諸症：キレ痔、イボ痔
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

5 ツムラ安中散
エキス顆粒(医療用) [TJ-5]

〔効能又は効果〕
やせ型で腹部筋肉が弛緩する傾向にあり、胃痛または腹痛があつて、ときに胸やけ、げっぷ、食欲不振、はきけなどを伴う次の諸症：
神経性胃炎、慢性胃炎、胃アトニー
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

6 ツムラ十味敗毒湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-6]

〔効能又は効果〕
化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、じんましん、急性湿疹、水虫
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

7 ツムラ八味地黄丸
エキス顆粒(医療用) [TJ-7]

〔効能又は効果〕
疲労、倦怠感著しく、尿量減少または頻数、口渴し、手足に交互的に冷感と熱感のあるものの次の諸症：
腎炎、糖尿病、陰萎、坐骨神経痛、腰痛、脚気、膀胱カタル、前立腺肥大、高血圧
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

8 ツムラ大柴胡湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-8]

〔効能又は効果〕
比較的体力のある人で、便秘がちで、上腹部が張って苦しく、耳鳴り、肩こりなど伴うものの次の諸症：
胆石症、胆のう炎、黄疸、肝機能障害、高血圧症、脳溢血、じんましん、胃酸過多症、急性胃腸カタル、悪心、嘔吐、食欲不振、痔疾、糖尿病、ノイローゼ、不眠症
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

9 ツムラ小柴胡湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-9]

〔効能又は効果〕
1. 体力中等度で上腹部がはって苦しく、舌苔を生じ、口中不快、食欲不振、時により微熱、悪心などのあるものの次の諸症：
諸種の急性熱性病、肺炎、気管支炎、気管支喘息、感冒、リンパ腺炎、慢性胃腸障害、産後回復不全
2. 慢性肝炎における肝機能障害の改善
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

10 ツムラ柴胡桂枝湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-10]

〔効能又は効果〕
発熱汗出て、悪寒し、身体痛み、頭痛、はきけのあるものの次の諸症：感冒・流感・肺炎・肺結核などの熱性疾患、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胆のう炎・胆石・肝機能障害・脾臓炎などの心下部緊張疼痛
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

11 ツムラ柴胡桂枝乾姜湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-11]

〔効能又は効果〕
体力が弱く、冷え症、貧血気味で、動悸、息切れがあり、神経過敏のものの次の諸症：
更年期障害、血の道症、神経症、不眠症
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

12 ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-12]

〔効能又は効果〕
比較的体力があり、心悸亢進、不眠、いらだち等の精神症状のあるものの次の諸症：高血圧症、動脈硬化症、慢性腎臓病、神経衰弱症、神経性心悸亢進症、てんかん、ヒステリー、小児夜啼症、陰萎
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

14 ツムラ半夏瀉心湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-14]

〔効能又は効果〕
みぞおちがつかえ、ときに悪心、嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って軟便または下痢の傾向のあるものの次の諸症：急・慢性胃腸カタル、酸酵性下痢、消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神経症
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

15 ツムラ黄連解毒湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-15]

〔効能又は効果〕
比較的体力があり、のぼせがみで顔色赤く、いらいらする傾向のある次の諸症：
鼻出血、高血圧、不眠症、ノイローゼ、胃炎、二日酔、血の道症、めまい、動悸、湿疹・皮膚炎、皮膚痒痒症
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

16 ツムラ半夏厚朴湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-16]

〔効能又は効果〕
気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症：
不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声、神経性食道狭窄症、不眠症
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

17 ツムラ五苓散
エキス顆粒(医療用) [TJ-17]

〔効能又は効果〕
口渴、尿量減少するものの次の諸症：浮腫、ネフローゼ、二日酔、急性胃腸カタル、下痢、悪心、嘔吐、めまい、胃内停水、頭痛、尿毒症、暑気あたり、糖尿病
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

18 ツムラ桂枝加朮附湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-18]

〔効能又は効果〕
関節痛、神経痛
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

19 ツムラ小青竜湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-19]

〔効能又は効果〕
下記疾患における水様の痰、水様鼻汁、鼻閉、くしゃみ、喘鳴、咳嗽、流涙：
気管支炎、気管支喘息、鼻炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、感冒
用量(9.0g/日、分包包1包3.0g)

20 ツムラ防己黄耆湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-20]

〔効能又は効果〕
色白で筋肉軟らかく水ぶりの体質で疲れやすく、汗が多く、小便不利で下肢に浮腫をきたし、膝関節の腫痛するものの次の諸症：
腎炎、ネフローゼ、妊娠腎、陰囊水腫、肥満症、関節炎、癰、癌、筋炎、浮腫、皮膚病、多汗症、月経不順
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

21 ツムラ小半夏加茯苓湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-21]

〔効能又は効果〕
体力中等度の次の諸症：妊娠嘔吐(つわり)、そのほかの諸病の嘔吐(急性胃腸炎、湿性胸膜炎、水腫性脚気、蓄膿症)
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

22 ツムラ消風散
エキス顆粒(医療用) [TJ-22]

〔効能又は効果〕
分泌物が多く、かゆみの強い慢性の皮膚病(湿疹、蕁麻疹、水虫、あせも、皮膚痒痒症)
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

23 ツムラ当帰芍薬散
エキス顆粒(医療用) [TJ-23]

〔効能又は効果〕
筋肉が一体に軟弱で疲労しやすく、腰脚の冷えやすいものの次の諸症：貧血、倦怠感、更年期障害(頭重、頭痛、めまい、肩こり等)、月経不順、月経困難、不妊症、動悸、慢性腎炎、妊娠中の諸病(浮腫、習慣性流産、痔、腹痛)、脚気、半身不随、心臓弁膜症
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

24 ツムラ加味逍遙散
エキス顆粒(医療用) [TJ-24]

〔効能又は効果〕
体質虚弱な婦人で肩がこり、疲れやすく、精神不安などの精神神経症状、ときに便秘の傾向のある次の諸症：
冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

25 ツムラ桂枝茯苓丸
エキス顆粒(医療用) [TJ-25]

〔効能又は効果〕
体格はしっかりして赤ら顔が多く、腹部は大体充実、下腹部に抵抗のあるものの次の諸症：子宮並びにその付属器の炎症、子宮内膜炎、月経不順、月経困難、帯下、更年期障害(頭痛、めまい、のぼせ、肩こり等)、冷え症、腹膜炎、打撲症、痔疾患、睾丸炎
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

26 ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-26]

〔効能又は効果〕
下腹直腹筋に緊張のある比較的体力の衰えているものの次の諸症：
小児夜啼症、神経衰弱、性的神経衰弱、遺精、陰萎
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

27 ツムラ麻黄湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-27]

〔効能又は効果〕
悪寒、発熱、頭痛、腰痛、自然に汗の出ないものの次の諸症：感冒、インフルエンザ(初期のもの)、関節リウマチ、喘息、乳癌の鼻閉塞、哺乳困難
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

28 ツムラ越婢加朮湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-28]

〔効能又は効果〕
浮腫と汗が出て小便不利のあるものの次の諸症：
腎炎、ネフローゼ、脚気、関節リウマチ、夜尿症、湿疹
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

29 ツムラ麦門冬湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-29]

〔効能又は効果〕
痰の切れにくい咳、気管支炎、気管支ぜんそく
用量(9.0g/日、分包包1包3.0g)

30 ツムラ真武湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-30]

〔効能又は効果〕
新陳代謝の沈衰しているものの次の諸症：
胃腸疾患、胃腸虚弱症、慢性腸炎、消化不良、胃アトニー症、胃下垂症、ネフローゼ、腹膜炎、脳溢血、脊髄疾患による運動ならびに知覚麻痺、神経衰弱、高血圧症、心臓弁膜症、心不全で心悸亢進、半身不随、リウマチ、老人性痒痒症
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

31 ツムラ呉茱萸湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-31]

〔効能又は効果〕
手足の冷えやすい中等度以下の体力のものの次の諸症：
習慣性偏頭痛、習慣性頭痛、嘔吐、脚気衝心
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

32 ツムラ人參湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-32]

〔効能又は効果〕
体質虚弱の人、或いは虚弱により体力低下した人の次の諸症：
急性・慢性胃腸カタル、胃アトニー症、胃拡張、悪阻(つわり)、萎縮腎
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

33 ツムラ大黃牡丹皮湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-33]

【効能又は効果】
比較的体力があり、下腹部痛があって、便秘しがちなものの次の諸症：月経不順、月経困難、便秘、痔疾
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

34 ツムラ白虎加入参湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-34]

【効能又は効果】
のどの渇きとほてりのあるもの
用量(9.0g/日、分包包1包3.0g)

35 ツムラ四逆散
エキス顆粒(医療用) [TJ-35]

【効能又は効果】
比較的体力のあるもので、大柴胡湯証と小柴胡湯証との中間証を表わすものの次の諸症：
胆嚢炎、胆石症、胃炎、胃酸過多、胃潰瘍、鼻カタル、気管支炎、神経質、ヒステリー
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

36 ツムラ木防己湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-36]

【効能又は効果】
顔色がさえず、咳をともなう呼吸困難があり、心臓下部に緊張圧重感があるものの心臓、あるいは、腎臓にもとづく疾患、浮腫、心臓性喘息
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

37 ツムラ半夏白朮天麻湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-37]

【効能又は効果】
胃腸虚弱で下肢が冷え、めまい、頭痛などがある者
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

38 ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-38]

【効能又は効果】
手足の冷えを感じ、下肢が冷えると下肢又は下腹部が痛くなり易いものの次の諸症：
しもやけ、頭痛、下腹部痛、腰痛
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

39 ツムラ苓桂朮甘湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-39]

【効能又は効果】
めまい、ふらつきがあり、または動悸があり尿量が減少するものの次の諸症：
神経質、ノイローゼ、めまい、動悸、息切れ、頭痛
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

40 ツムラ猪苓湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-40]

【効能又は効果】
尿量減少、小便難、口渴を訴えるものの次の諸症：
尿道炎、腎臓炎、腎石症、淋炎、排尿痛、血尿、腰以下の浮腫、残尿感、下痢
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

41 ツムラ補中益気湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-41]

【効能又は効果】
消化機能が衰え、四肢倦怠感著しい虚弱体質者の次の諸症：
夏やせ、病後の体力増強、結核症、食欲不振、胃下垂、感冒、痔、脱肛、子宮下垂、陰萎、半身不随、多汗症
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

43 ツムラ六君子湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-43]

【効能又は効果】
胃腸の弱いもので、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症：
胃炎、胃アトニー、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

45 ツムラ桂枝湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-45]

【効能又は効果】
体力が衰えたときの風邪の初期
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

46 ツムラ七物降下湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-46]

【効能又は効果】
身体虚弱の傾向のあるものの次の諸症：
高血圧に伴う随伴症状(のぼせ、肩こり、耳なり、頭痛)
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

47 ツムラ釣藤散
エキス顆粒(医療用) [TJ-47]

【効能又は効果】
慢性に続く頭痛で中年以降、または高血圧の傾向のあるもの
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

48 ツムラ十全大補湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-48]

【効能又は効果】
病後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

50 ツムラ荊芥連翹湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-50]

【効能又は効果】
蓄膿症、慢性鼻炎、慢性扁桃炎、にきび
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

51 ツムラ潤腸湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-51]

【効能又は効果】
便秘
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

52 ツムラ薏苡仁湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-52]

【効能又は効果】
関節痛、筋肉痛
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

53 ツムラ疎経活血湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-53]

【効能又は効果】
関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

54 ツムラ抑肝散
エキス顆粒(医療用) [TJ-54]

【効能又は効果】
虚弱な体質で神経がたかぶるものの次の諸症：
神経症、不眠症、小児夜なき、小児疳症
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

55 ツムラ麻香甘石湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-55]

【効能又は効果】
小児ぜんそく、気管支ぜんそく
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

56 ツムラ五淋散
エキス顆粒(医療用) [TJ-56]

【効能又は効果】
頻尿、排尿痛、残尿感
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

57 ツムラ温清飲
エキス顆粒(医療用) [TJ-57]

【効能又は効果】
皮膚の色つやが悪く、のぼせるものに用いる：
月経不順、月経困難、血の道症、更年期障害、神経症
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

58 ツムラ清上防風湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-58]

【効能又は効果】
にきび
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

59 ツムラ治頭瘡一方
エキス顆粒(医療用) [TJ-59]

【効能又は効果】
湿疹、くさ、乳幼児の湿疹
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

60 ツムラ桂枝加芍薬湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-60]

【効能又は効果】
腹部膨満感のある次の諸症：しぶり腹、腹痛
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

61 ツムラ桃核承気湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-61]

【効能又は効果】
比較的体力があり、のぼせて便秘しがちなものの次の諸症：
月経不順、月経困難症、月経時や産後の精神不安、腰痛、便秘、高血圧の随伴症状(頭痛、めまい、肩こり)
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

62 ツムラ防風通聖散
エキス顆粒(医療用) [TJ-62]

【効能又は効果】
腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなもの次の諸症：
高血圧の随伴症状(どうき、肩こり、のぼせ)、肥満症、むくみ、便秘
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

63 ツムラ五積散
エキス顆粒(医療用) [TJ-63]

【効能又は効果】
慢性に経過し、症状の激しくない次の諸症：
胃腸炎、腰痛、神経痛、関節痛、月経痛、頭痛、冷え症、更年期障害、感冒
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

64 ツムラ炙甘草湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-64]

【効能又は効果】
体力がおとろえて、疲れやすいものの動悸、息切れ
用量(9.0g/日、分包包1包3.0g)

65 ツムラ帰脾湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-65]

【効能又は効果】
虚弱体質で血色の悪い人の次の諸症：貧血、不眠症
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

66 ツムラ参蘇飲
エキス顆粒(医療用) [TJ-66]

【効能又は効果】
感冒、せき
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

67 ツムラ女神散
エキス顆粒(医療用) [TJ-67]

【効能又は効果】
のぼせとめまいのあるものの次の諸症：
産前産後の神経症、月経不順、血の道症
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

68 ツムラ芍薬甘草湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-68]

【効能又は効果】
急激におこる筋肉のけいれんを伴う疼痛、筋肉・関節痛、胃痛、腹痛
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

69 ツムラ茯苓飲
エキス顆粒(医療用) [TJ-69]

【効能又は効果】
吐きげや胸やけがあり尿量が減少するものの次の諸症：
胃炎、胃アトニー、瀧飲
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

70 ツムラ香蘇散
エキス顆粒(医療用) [TJ-70]

【効能又は効果】
胃腸虚弱で神経質の人の風邪の初期
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

71 ツムラ四物湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-71]

【効能又は効果】
皮膚が乾燥し、色つやの悪い体質で胃腸障害のない人の次の諸症：
産後あるいは流産後の疲労回復、月経不順、冷え症、しもやけ、しみ、血の道症
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

72 ツムラ甘麦大枣湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-72]
〔効能又は効果〕
夜泣き、ひきつけ
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

73 ツムラ柴陥湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-73]
〔効能又は効果〕
咳、咳による胸痛
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

74 ツムラ調胃承気湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-74]
〔効能又は効果〕
便秘
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

75 ツムラ四君子湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-75]
〔効能又は効果〕
やせて顔色が悪くて、食欲がなく、つかれやすいもの
の次の諸症：胃腸虚弱、慢性胃炎、胃のもたれ、嘔吐、下痢
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

76 ツムラ竜胆瀉肝湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-76]
〔効能又は効果〕
比較的体力があり、下腹部筋肉が緊張する傾向がある
ものの次の諸症：排尿痛、残尿感、尿の濁り、こしけ
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

77 ツムラ芍帰膠艾湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-77]
〔効能又は効果〕
痔出血
用量(9.0g/日、分包包1包3.0g)

78 ツムラ麻杏薤甘湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-78]
〔効能又は効果〕
関節痛、神経痛、筋肉痛
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

79 ツムラ平胃散
エキス顆粒(医療用) [TJ-79]
〔効能又は効果〕
胃がもたれて消化不良の傾向のある次の諸症：
急・慢性胃カタル、胃アトニー、消化不良、食欲不振
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

80 ツムラ柴胡清肝湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-80]
〔効能又は効果〕
かんの強い傾向のある小児の次の諸症：
神経症、慢性扁桃腺炎、湿疹
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

81 ツムラ二陳湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-81]
〔効能又は効果〕
悪心、嘔吐
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

82 ツムラ桂枝人参湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-82]
〔効能又は効果〕
胃腸の弱い人の次の諸症：
頭痛、動悸、慢性胃腸炎、胃アトニー
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

83 ツムラ抑肝散加陳皮半夏
エキス顆粒(医療用) [TJ-83]
〔効能又は効果〕
虚弱な体質で神経がたかぶるものの次の諸症：
神経症、不眠症、小児夜なき、小児疳症
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

84 ツムラ大黃甘草湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-84]
〔効能又は効果〕
便秘症
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

85 ツムラ神祕湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-85]
〔効能又は効果〕
小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

86 ツムラ当帰飲子
エキス顆粒(医療用) [TJ-86]
〔効能又は効果〕
冷え症のもの次の諸症：
慢性湿疹(分泌物の少ないもの)、かゆみ
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

87 ツムラ六味丸
エキス顆粒(医療用) [TJ-87]
〔効能又は効果〕
疲れやすくて尿量減少または多尿で、時に口渇がある
ものの次の諸症：排尿困難、頻尿、むくみ、かゆみ
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

88 ツムラ二朮湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-88]
〔効能又は効果〕
五十肩
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

89 ツムラ治打撲一方
エキス顆粒(医療用) [TJ-89]
〔効能又は効果〕
打撲によるはれ及び痛み
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

90 ツムラ清肺湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-90]
〔効能又は効果〕
痰の多く出る咳
用量(9.0g/日、分包包1包3.0g)

91 ツムラ竹節温胆湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-91]
〔効能又は効果〕
インフルエンザ、風邪、肺炎などの回復期に熱が長び
いたり、また平熱になっても、気分がさっぱりせず、
せきや痰が多くて安眠が出来ないもの
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

92 ツムラ滋陰至宝湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-92]
〔効能又は効果〕
虚弱なものの慢性的せき・たん
用量(9.0g/日、分包包1包3.0g)

93 ツムラ滋陰降火湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-93]
〔効能又は効果〕
のどにうるおいがなく痰の出なくて咳こむもの
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

95 ツムラ五虎湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-95]
〔効能又は効果〕
せき、気管支ぜんそく
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

96 ツムラ柴朴湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-96]
〔効能又は効果〕
気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、時に
動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症：
小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎、せき、不
安神経症
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

97 ツムラ大防風湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-97]
〔効能又は効果〕
関節がはれて痛み、麻痺、強直して屈伸しがたいもの
の次の諸症：
下肢の関節リウマチ、慢性関節炎、痛風
用量(10.5g/日、分包包1包3.5g)

98 ツムラ黄耆建中湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-98]
〔効能又は効果〕
身体虚弱で疲労しやすいもの次の諸症：
虚弱体質、病後の衰弱、ねあせ
用量(18.0g/日、分包包2包(1包3.0g))

99 ツムラ小建中湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-99]
〔効能又は効果〕
体質虚弱で疲労しやすく、血色がすぐれず、腹痛、動
悸、手足のほてり、冷え、頻尿および多尿などのいず
れかを伴う次の諸症：
小児虚弱体質、疲労倦怠、神経質、慢性胃腸炎、小児
夜尿症、夜なき
用量(15.0g/日、分包包1包2.5g)

100 ツムラ大建中湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-100]
〔効能又は効果〕
腹が冷えて痛み、腹部膨満感のあるもの
用量(15.0g/日、分包包1包2.5g)

101 ツムラ升麻葛根湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-101]
〔効能又は効果〕
感冒の初期、皮膚炎
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

102 ツムラ当帰湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-102]
〔効能又は効果〕
背中に寒冷を覚え、腹部膨満感や腰痛のあるもの
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

103 ツムラ酸棗仁湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-103]
〔効能又は効果〕
心身がつかれ弱って眠れないもの
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

104 ツムラ辛夷清肺湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-104]
〔効能又は効果〕
鼻つまり、慢性鼻炎、蓄膿症
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

105 ツムラ通導散
エキス顆粒(医療用) [TJ-105]
〔効能又は効果〕
比較的体力があり下腹部に圧痛があつて便秘しがちな
ものの次の諸症：
月経不順、月経痛、更年期障害、腰痛、便秘、打ち身
(打撲)、高血圧の随伴症状(頭痛、めまい、肩こり)
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

106 ツムラ温経湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-106]
〔効能又は効果〕
手足がほてり、唇がかわくもの次の諸症：
月経不順、月経困難、こしけ、更年期障害、不眠、
神経症、湿疹、足腰の冷え、しもやけ
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

107 ツムラ牛車腎気丸
エキス顆粒(医療用) [TJ-107]
〔効能又は効果〕
疲れやすくて、四肢が冷えやすく尿量減少または多尿
で時に口渇がある次の諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、
老人のかすみ、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

108 ツムラ人參養榮湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-108]
〔効能又は効果〕
病後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足
の冷え、貧血
用量(9.0g/日、分包包1包3.0g)

109 ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏
エキス顆粒(医療用) [TJ-109]
〔効能又は効果〕
咽喉がはれて痛む次の諸症：扁桃炎、扁桃周囲炎
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

110 ツムラ立効散
エキス顆粒(医療用) [TJ-110]
〔効能又は効果〕
抜歯後の疼痛、歯痛
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

111 ツムラ清心蓮子飲
エキス顆粒(医療用) [TJ-111]
〔効能又は効果〕
全身倦怠感があり、口や舌が乾き、尿が出しづるもの次の諸症：残尿感、頻尿、排尿痛
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

112 ツムラ猪苓湯合四物湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-112]
〔効能又は効果〕
皮膚が乾燥し、色つやの悪い体質で胃腸障害のない人の次の諸症：
排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

113 ツムラ三黄瀉心湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-113]
〔効能又は効果〕
比較的体力があり、のぼせ気味で、顔面紅潮し、精神不安で、便秘の傾向のあるもの次の諸症：
高血圧の随伴症状(のぼせ、肩こり、耳なり、頭重、不眠、不安)、鼻血、痔出血、便秘、更年期障害、血の道症
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

114 ツムラ柴苓湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-114]
〔効能又は効果〕
吐き気、食欲不振、のどのかわき、排尿が少ないなどの次の諸症：
水瀉性下痢、急性胃腸炎、暑気あたり、むくみ
用量(9.0g/日、分包包1包3.0g)

115 ツムラ胃苓湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-115]
〔効能又は効果〕
水瀉性下痢、嘔吐があり、口渴、尿量減少を伴う次の諸症：
食あたり、暑気あたり、冷え腹、急性胃腸炎、腰痛
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

116 ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-116]
〔効能又は効果〕
気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、時に動悸、めまい、嘔気、胸やけなどがあり、尿量の減少するもの次の諸症：
不安神経症、神経性胃炎、つわり、溜飲、胃炎
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

117 ツムラ茵陳五苓散
エキス顆粒(医療用) [TJ-117]
〔効能又は効果〕
のどが渇いて、尿が少ないもの次の諸症：
嘔吐、じんましん、二日酔のむかつき、むくみ
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

118 ツムラ苓姜朮甘湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-118]
〔効能又は効果〕
腰に冷えと痛みがあって、尿量が多い次の諸症：
腰痛、腰の冷え、夜尿症
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

119 ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-119]
〔効能又は効果〕
貧血、冷え症で喘鳴を伴う喀痰の多い咳嗽があるもの。気管支炎、気管支喘息、心臓衰弱、腎臓病
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

120 ツムラ黄連湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-120]
〔効能又は効果〕
胃部の停滞感や重圧感、食欲不振のあるもの次の諸症：
急性胃炎、二日酔、口内炎
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

121 ツムラ三物黄芩湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-121]
〔効能又は効果〕
手足のほてり
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

122 ツムラ排膿散及湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-122]
〔効能又は効果〕
患部が発赤、腫脹して疼痛をともなった化膿症、癰、癤、面疔、その他癰腫症
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

123 ツムラ当帰建中湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-123]
〔効能又は効果〕
疲労しやすく、血色のすぐれないもの次の諸症：
月経痛、下腹部痛、痔、脱肛の痛み
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

124 ツムラ川芎茶調散
エキス顆粒(医療用) [TJ-124]
〔効能又は効果〕
かぜ、血の道症、頭痛
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

125 ツムラ桂枝茯苓丸加薏苡仁
エキス顆粒(医療用) [TJ-125]
〔効能又は効果〕
比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるもの次の諸症：
月経不順、血の道症、にきび、しみ、手足のあれ
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

126 ツムラ麻子仁丸
エキス顆粒(医療用) [TJ-126]
〔効能又は効果〕
便秘
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

127 ツムラ麻黄附子細辛湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-127]
〔効能又は効果〕
悪寒、微熱、全身倦怠、低血圧で頭痛、めまいあり、四肢に疼痛冷感あるもの次の諸症：
感冒、気管支炎
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

128 ツムラ啓脾湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-128]
〔効能又は効果〕
やせて、顔色が悪く、食欲がなく、下痢の傾向があるもの次の諸症：
胃腸虚弱、慢性胃腸炎、消化不良、下痢
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

133 ツムラ大承気湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-133]
〔効能又は効果〕
腹部がかたくつかえて、便秘するもの、あるいは肥満体質で便秘するもの。
常習便秘、急性便秘、高血圧、神経症、食当り
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

134 ツムラ桂枝加芍薬大黄湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-134]
〔効能又は効果〕
比較的体力のない人で、腹部膨満し、腸内の停滞感あるいは腹痛などを伴うもの次の諸症：
1. 急性腸炎、大腸カタル
2. 常習便秘、宿便、しぶり腹
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

135 ツムラ茵陳蒿湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-135]
〔効能又は効果〕
尿量減少、や、便秘がちで比較的体力のあるもの次の諸症：
黄疸、肝硬変症、ネフローゼ、じんましん、口内炎
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

136 ツムラ清暑益気湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-136]
〔効能又は効果〕
暑気あたり、量さによる食欲不振・下痢・全身倦怠、夏やせ
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

137 ツムラ加味帰脾湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-137]
〔効能又は効果〕
虚弱体質で血色の悪い人の次の諸症：
貧血、不眠症、精神不安、神経症
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

138 ツムラ桔梗湯
エキス顆粒(医療用) [TJ-138]
〔効能又は効果〕
咽喉がはれて痛む次の諸症：扁桃炎、扁桃周囲炎
用量(7.5g/日、分包包1包2.5g)

501 ツムラ紫雲膏
エキス顆粒(医療用) [TJ-501]
〔効能又は効果〕
火傷、痔核による疼痛、肛門裂傷

3020 ツムラの生薬コウジン末(調剤用)
エキス顆粒(医療用) [TJ-3020]
〔効能又は効果〕〔用法及び用量〕
漢方処方の調剤に用いる。

3023 日本薬局方ブシ末 ブシ末(調剤用)「ツムラ」
エキス顆粒(医療用) [TJ-3023]
〔効能又は効果〕〔用法及び用量〕
漢方処方の調剤に用いる。

〔用法及び用量〕
通常、成人1日量*を2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
*製品により1日量は異なります。

■分包包 1包あたりのg数
1包あたり2.5g
下記以外の処方
117品目
※当資料中、下地が□白、又は□ピンクが該当します。

1包あたり3.0g
19 ツムラ小青竜湯
29 ツムラ麦門冬湯
34 ツムラ白虎加入参湯
64 ツムラ炙甘草湯
77 ツムラ芍薬膠艾湯
90 ツムラ清肺湯
92 ツムラ滋陰室宝湯
98 ツムラ黄耆建中湯
108 ツムラ人参養荣湯
114 ツムラ柴苓湯
10品目
※当資料中、下地が□ブルー、又は□黄色が該当します。

1包あたり3.5g
97 ツムラ大防風湯
※当資料中、下地が□グリーンが該当します。

※組成、用法及び用量、使用上の注意等は製品添付文書をご覧ください。

ツムラ医療用漢方製剤 五十音順索引

<p>㊦ (5) 安中散</p> <p>㊧ (115) 胃苓湯</p> <p>(135) 茵陳蒿湯</p> <p>(117) 茵陳五苓散</p> <p>㊨ (106) 溫経湯</p> <p>(57) 温清飲</p> <p>㊩ (28) 越婢加朮湯</p> <p>㊪ (98) 黄耆建中湯</p> <p>(15) 黄連解毒湯</p> <p>(120) 黄連湯</p> <p>(3) 乙字湯</p> <p>㊫ (1) 葛根湯</p> <p>(2) 葛根湯加川芎辛夷</p> <p>(137) 加味帰脾湯</p> <p>(24) 加味逍遙散</p> <p>(72) 甘麦大枣湯</p> <p>㊬ (138) 桔梗湯</p> <p>(65) 帰脾湯</p> <p>(77) 芍薬膠艾湯</p> <p>㊭ (50) 荆芥連翹湯</p> <p>(134) 桂枝加芍薬大黃湯</p> <p>(60) 桂枝加芍薬湯</p> <p>(18) 桂枝加朮附湯</p> <p>(26) 桂枝加竜骨牡蛎湯</p> <p>(45) 桂枝湯</p> <p>(82) 桂枝人参湯</p> <p>(25) 桂枝茯苓丸</p>	<p>㊮ (125) 桂枝茯苓丸加薏苡仁</p> <p>(128) 啓膈湯</p> <p>㊯ (300) コウジュ末</p> <p>(70) 香蘇散</p> <p>(95) 五虎湯</p> <p>(63) 五積散</p> <p>(107) 牛車腎気丸</p> <p>(31) 呉茱萸湯</p> <p>(56) 五淋散</p> <p>(17) 五苓散</p> <p>㊰ (73) 柴陥湯</p> <p>(12) 柴胡加竜骨牡蛎湯</p> <p>(11) 柴胡桂枝乾姜湯</p> <p>(10) 柴胡桂枝湯</p> <p>(80) 柴胡清肝湯</p> <p>(96) 柴朴湯</p> <p>(114) 柴苓湯</p> <p>(113) 三黄瀉心湯</p> <p>(103) 酸棗仁湯</p> <p>(121) 三物黄芩湯</p> <p>㊱ (93) 滋陰降火湯</p> <p>(92) 滋陰至宝湯</p> <p>(50) 紫雲膏</p> <p>(35) 四逆散</p> <p>(75) 四君子湯</p> <p>(46) 七物降下湯</p> <p>(71) 四物湯</p>	<p>㊲ (64) 炙甘草湯</p> <p>(68) 芍薬甘草湯</p> <p>(48) 十全大補湯</p> <p>(6) 十味敗毒湯</p> <p>(51) 酒蕩湯</p> <p>(99) 小建中湯</p> <p>(9) 小柴胡湯</p> <p>(109) 小柴胡湯加桔梗石膏</p> <p>(19) 小青竜湯</p> <p>(21) 小半夏加茯苓湯</p> <p>(22) 消風散</p> <p>(101) 升麻葛根湯</p> <p>(104) 辛夷清肺湯</p> <p>(66) 参蘇飲</p> <p>(85) 神秘湯</p> <p>(30) 真武湯</p> <p>㊳ (58) 清上防風湯</p> <p>(136) 清暑益気湯</p> <p>(111) 清心蓮子飲</p> <p>(90) 清肺湯</p> <p>(124) 川芎茶調散</p> <p>㊴ (53) 疎経活血湯</p> <p>㊵ (84) 大黃甘草湯</p> <p>(33) 大黃牡丹皮湯</p> <p>(100) 大建中湯</p> <p>(8) 大柴胡湯</p> <p>(133) 大承気湯</p>	<p>㊶ (97) 大防風湯</p> <p>㊷ (91) 竹筴温胆湯</p> <p>(89) 治打撲一方</p> <p>(59) 治頭瘡一方</p> <p>(74) 調胃承気湯</p> <p>(47) 釣藤散</p> <p>(40) 猪苓湯</p> <p>(112) 猪苓湯谷四物湯</p> <p>㊸ (105) 通導散</p> <p>㊹ (61) 桃核承気湯</p> <p>(86) 当帰飲子</p> <p>(123) 当帰建中湯</p> <p>(38) 当帰四逆加呉茱萸生姜湯</p> <p>(23) 当帰芍薬散</p> <p>(102) 当帰湯</p> <p>㊺ (88) ニホ湯</p> <p>(81) ニ陳湯</p> <p>(67) 女神散</p> <p>(32) 人参湯</p> <p>(108) 人参養榮湯</p> <p>㊻ (122) 排膿散及湯</p> <p>(29) 菱門冬湯</p> <p>(7) 八味地黄丸</p> <p>(16) 半夏厚朴湯</p> <p>(14) 半夏瀉心湯</p> <p>(37) 半夏白朮天麻湯</p>	<p>㊼ (34) 白虎加入参湯</p> <p>㊽ (69) 茯苓飲</p> <p>(116) 茯苓飲合半夏厚朴湯</p> <p>(303) ブシ末</p> <p>㊾ (79) 平胃散</p> <p>㊿ (20) 防己黄耆湯</p> <p>(62) 防風通聖散</p> <p>(41) 補中益気湯</p> <p>㊽ (27) 麻黄湯</p> <p>(127) 麻黄附子細辛湯</p> <p>(55) 麻杏甘石湯</p> <p>(78) 麻杏薏甘湯</p> <p>(126) 麻子仁丸</p> <p>㊿ (36) 木防己湯</p> <p>㊽ (52) 薏苡仁湯</p> <p>(54) 抑肝散</p> <p>(83) 抑肝散加陳皮半夏</p> <p>㊽ (43) 六君子湯</p> <p>(110) 立効散</p> <p>(76) 竜胆瀉肝湯</p> <p>(119) 苓甘姜味辛夏仁湯</p> <p>(118) 苓姜朮甘湯</p> <p>(39) 苓桂朮甘湯</p> <p>㊽ (87) 六味丸</p>
---	---	--	---	---

ツムラ医療用漢方製剤・使用上の注意(警告・禁忌・相互作用・副作用)

■その他の使用上の注意(慎重投与、重要な基本的注意、高齢者への投与、妊婦、産婦、授乳婦への投与、小児等への投与)については製品添付文書をご覧ください。
 (※本表は各製品添付文書の「使用上の注意」等を表としてまとめたものです。内容の一部に添付文書の記載と異なる場合もございます。)

項目名				該当製品番号
警告	<p>【警告】</p> <p>1. 本剤の投与により、間質性肺炎が起り、早期に適切な処置を行わない場合、死亡等の重篤な転帰に至ることがあるので、患者の状態を十分観察し、発熱、咳嗽、呼吸困難、肺音の異常(捻髪音)、胸部X線異常等があらわれた場合には、ただちに本剤の投与を中止すること。</p> <p>2. 発熱、咳嗽、呼吸困難等があらわれた場合には、本剤の服用を中止し、ただちに連絡するよう患者に対し注意を行うこと。(「重大な副作用」の項参照)</p>			TJ-9(小柴胡湯)
禁忌	<p>【禁忌(次の患者には投与しないこと)】</p> <p>1. インターフェロン製剤を投与中の患者(「相互作用」の項参照)</p> <p>2. 肝硬変、肝癌の患者[間質性肺炎が起り、死亡等の重篤な転帰に至ることがある。]</p> <p>3. 慢性肝炎における肝機能障害で血小板数が10万/mm³以下の患者[肝硬変が疑われる。]</p>			TJ-9(小柴胡湯)
	<p>【禁忌(次の患者には投与しないこと)】</p> <p>1. アルドステロン症の患者 2. ミオパチーのある患者 3. 低カリウム血症のある患者 [1~3:これらの疾患及び症状が悪化するおそれがある。]</p>			(1日量としてカンゾウを2.5g以上含有する品目) TJ-14、19、32、56、64、68、72、77、82、120、122、138
	<p>【禁忌(次の患者には使用しないこと)】</p> <p>1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 2. 重度(重症)の熱傷・外傷のある患者</p> <p>3. 化膿性の創傷で高熱のある患者 4. 患部の湿潤やただれのひどい患者 [2~4:これらの症状が悪化するおそれがある。]</p>			TJ-501
相互作用	併用禁忌(併用しないこと)			
	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	
	インターフェロン製剤 インターフェロン-α インターフェロン-β	間質性肺炎があらわれることがある。 (「重大な副作用」の項参照)	機序は不明	TJ-9(小柴胡湯)
	併用注意(併用に注意すること)			
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	該当製品番号	
(1)マオウ含有製剤 (2)エフェドリン類含有製剤 (3)モアミン酸化酵素(MAO)阻害剤 (4)甲状腺製剤 チロキシン、リオチロン (5)カテコールアミン製剤 アドレナリン、イソプレナリン (6)キサンチン系製剤 テオフィリン、ジプロピリン	不眠、発汗過多、頻脈、動悸、全身脱力感、精神興奮等があらわれやすくなるので、減量するなど慎重に投与すること。	交感神経刺激作用が増強されることが考えられる。	TJ-1、2、19、27、28、52、55、62、63、78、85、95、127	
(1)カンゾウ含有製剤 (2)グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤 (3)ループ系利尿剤 フロセミド、エタクリン酸 (4)チアジド系利尿剤 トリクロルメチアジド	偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。 (「重大な副作用」の項参照)	グリチルリチン酸及び利尿剤は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。	TJ-9、14、19、32、38、56、64、68、72、77、82、120、122、138	
(1)カンゾウ含有製剤 (2)グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤	偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。 (「重大な副作用」の項参照)	グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。	TJ-1、2、3、5、6、10、11、18、20、22、24、26、27、28、29、34、35、39、41、43、45、47、48、50、51、52、53、54、55、58、59、60、61、62、63、65、66、67、70、73、74、75、76、78、79、80、81、83、84、85、86、88、89、90、91、92、93、95、96、97、98、99、101、102、103、105、106、108、109、110、111、114、115、118、119、123、124、128、134、136、137	

項目名	副作用	該当製品番号
間質性肺炎	発熱、咳嗽、呼吸困難、肺音の異常(捻髪音)等があらわれた場合には、本剤の投与を中止し、速やかに胸部X線等の検査を実施するとともに副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。 また、発熱、咳嗽、呼吸困難等があらわれた場合には、本剤の服用を中止し、ただちに連絡するよう患者に対し注意を行うこと。	TJ-3、8、9、10、11、12、14、15、19、20、29、41、51、62、90、96、104、107、111、114、121
	発熱、咳嗽、呼吸困難、肺音の異常等があらわれた場合には、本剤の投与を中止し、速やかに胸部X線、胸部CT等の検査を実施するとともに副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。	TJ-50、54、56、57、88、113
	咳嗽、呼吸困難、発熱、肺音の異常等があらわれた場合には、本剤の投与を中止し、速やかに胸部X線、胸部CT等の検査を実施するとともに副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。	TJ-68、76、100
偽アルドステロン症	低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。	TJ-1、2、3、5、6、9、10、11、14、18、19、20、22、24、26、27、28、29、32、34、35、38、39、41、43、45、47、48、50、51、52、53、54、55、56、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、70、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、88、89、90、91、92、93、95、96、97、98、99、101、102、103、105、106、108、109、110、111、114、115、118、119、120、122、123、124、128、134、136、137、138
うっ血性心不全、心室細動、心室頻拍(Torsades de Pointesを含む)	うっ血性心不全、心室細動、心室頻拍(Torsades de Pointesを含む)があらわれることがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を十分に行い、動悸、息切れ、倦怠感、めまい、失神等の異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。	TJ-68
心不全	心不全があらわれることがあるので、観察を十分に行い、体液貯留、急激な体重増加、心不全症状・徴候(息切れ、心胸比拡大、胸水等)が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。	TJ-54
重大な副作用	低カリウム血症の結果として、ミオパチー、横紋筋融解症があらわれることがあるので、脱力感、筋力低下、筋肉痛、四肢痙攣・麻痺、CK(CPK)上昇、血中及び尿中のミオグロビン上昇が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。	TJ-9、68
	低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。	TJ-1、2、3、5、6、10、11、14、18、19、20、22、24、26、27、28、29、32、34、35、38、39、41、43、45、47、48、50、51、52、53、55、56、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、70、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、88、89、90、91、92、93、95、96、97、98、99、101、102、103、105、106、108、109、110、111、114、115、118、119、120、122、123、124、128、134、136、137、138
	低カリウム血症の結果として、ミオパチー、横紋筋融解症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、筋力低下、筋肉痛、四肢痙攣・麻痺、CK(CPK)上昇、血中及び尿中のミオグロビン上昇が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。	TJ-54
	劇症肝炎、肝機能障害、黄疸	劇症肝炎、AST(GOT)、ALT(GPT)、Al-P、 γ -GTP等の著しい上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
肝機能障害、黄疸	AST(GOT)、ALT(GPT)、Al-P、 γ -GTPの著しい上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。	TJ-3、9、15、62、96、104、111
	AST(GOT)、ALT(GPT)、Al-P、 γ -GTPの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。	TJ-1、8、10、12、14、19、20、25、29、41、48、50、51、57、58、68、88、100、107、108、109、127、135
	AST(GOT)、ALT(GPT)、Al-P、 γ -GTP等の著しい上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。	TJ-11、24、43、54、67、76、90、113、121
腸間膜静脈硬化症	長期投与により、腸間膜静脈硬化症があらわれることがある。腹痛、下痢、便秘、腹部膨満感等が繰り返しあらわれた場合、又は便潜血陽性になった場合には投与を中止し、CT、大腸内視鏡等の検査を実施するとともに、適切な処置を行うこと。なお、腸管切除術に至った症例も報告されている。	TJ-15、24、104
その他の副作用	*過敏症 (発疹、発赤、痒痒、蕁麻疹等) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること	TJ-1、2、3、5、6、7、9、10、11、12、14、15、16、17、18、19、20、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、34、36、37、38、39、40、41、43、45、47、48、50、52、54、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、73、75、82、86、89、91、96、97、98、99、100、102、104、106、107、108、109、111、114、115、116、117、120、121、123、125、127、128、134、136、137、501、3020
	自律神経系 (不眠、発汗過多、頻脈、動悸、全身脱力感、精神興奮等)	TJ-1、2、19、27、28、52、55、62、63、78、85、95、127
	*肝臓(肝機能異常(AST(GOT)、ALT(GPT)、Al-P、 γ -GTP、T-Bil等の上昇))	TJ-7、17、23、27、31、34、38、100、105
	*消化器 (食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、腹痛、下痢、便秘、軟便、消化不良、口中不快感、口渇、腹部膨満感等)	TJ-1、2、3、6、7、8、9、10、12、15、19、22、23、24、25、27、28、33、34、36、38、40、41、43、46、47、48、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、61、62、63、64、65、67、68、71、74、76、77、78、80、83、84、85、86、87、89、90、92、93、95、96、97、100、102、103、104、105、106、107、108、109、112、113、114、121、123、124、125、126、127、133、134、135、136、137、3020
	泌尿器 (頻尿、排尿痛、血尿、残尿感、膀胱炎等) このような症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。	TJ-96、114
	*泌尿器 (排尿障害、血尿、残尿感、膀胱炎、頻尿、排尿痛等)	TJ-1、2、9、10、19、27、28、52、55、62、63、78、85、95、127
	*その他 (心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心、全身倦怠感等)	TJ-7、18、30、97、107、114、127、3023

* 上記その他の副作用の「過敏症」「肝臓」「消化器」「泌尿器(TJ-96、114以外)」「その他」の各症状等につきましては、製品によって異なりますので添付文書をご覧ください。